



懸吊飼槽

隔內間隙風的直接吹襲或仔雞的迷離，進而提高育雛率與整齊度。

隔屏材料冬季以甘蔗板，夏季以網狀屏板，但最好以價格低廉，使用一次後即可燒棄者為宜。

收容三百至五百隻小雞的育雛器，必須圍以四十平方呎左右的圓形或角形圍屏；就是離開邊緣五十至六十公分的程度。高度以三十五至四十五公分為宜。

(4) 準備飼料槽和飲水器：以一百隻計算的飼料槽和飲水器長度標準如表三。

上述標準，當飼槽水槽兩側均可採食時，則可減半計算。又小雞水槽與飼槽距離不可超過十臺尺以上。

如用十公斤容量的懸吊飼槽（如上圖），適用標準如表四。

進雛後的管理要點

(1) 仔雛放入傘內華氏九十度的適溫下，首先喂給糖水（水五公升加糖三至四小杯）或水溶性維他命液。冬季時略加微溫，可以幫助仔雛恢復疲勞。

(2) 以卵黃的消化情形來決定喂料時間。如果消化不好時，稍休息一、二小時後再給飼料。開始喂料的三天內，每天分五、六次做成練餌，撒在厚紙上，任小雞採食。第三天以後才改用粉餌，裝在飼料盤任其取食。

(3) 注意溫度，要將溫度計放在傘緣下，離墊料面約五公分高，以測量正確溫度。保溫標準如表五。

(4) 傘內要有一盞標示燈，防止密集與不安感，也可促進採食。同時在二至三日內，每夜應巡視數次，把仔雛趕入傘內部保溫。

無籽桶柑·市面歡迎

無籽桶柑並不是新發明的品種，而是高桶柑的芽變系統。它的樹勢和產量，與一般優良品系高桶柑略同，栽培方法亦無差異。

無籽桶柑除果形較大外，果汁成分等與一般高桶柑相似，但因無籽，所以較適製罐，也較受市面歡迎。

宜蘭縣頭城鎮新建里「新建農園」有無籽桶柑母樹園，並繁殖苗木，可前往參觀結果情形等。（宜蘭市林振源農友來信詢問無籽桶柑問題，請參看本文。）（翁仁祿）

表五：育雛期間保溫標準

日齡	溫度
一	三十一
二	三十
三	二十九
四	二十八
五	二十七
六	二十六
七	二十五
八	二十四
九	二十三
十	二十二
十一	二十一
十二	二十
十三	十九
十四	十八
十五	十七
十六	十六
十七	十五
十八	十四
十九	十三
二十	十二
二十一	十一
二十二	十
二十三	九
二十四	八
二十五	七
二十六	六
二十七	五
二十八	四
二十九	三
三十	二
三十一	一
三十二	零
三十三	零下
三十四	零下
三十五	零下
三十六	零下
三十七	零下
三十八	零下
三十九	零下
四十	零下
四十一	零下
四十二	零下
四十三	零下
四十四	零下
四十五	零下
四十六	零下
四十七	零下
四十八	零下
四十九	零下
五十	零下

(5) 一週後的管理計劃：

管理要項

第八日 先將兩側圍屏擴大，準備去

除圍屏。

第十至十二日 去除圍屏。

第十四日 切嘴，上嘴修剪三分之一，

下嘴呈鈍形。

第二十日 改用懸吊式飼料筒，育雛器

徐徐上昇，暖天氣自天停

止給溫。

第二十一日 雞痘預防接種。

第二十三至二十五日 廢溫。春秋季分十至十四日

，夏季三至七日，冬季二十

至二十五日慢慢廢溫。

第二十八至五十六日 新城雞痘預防注射。注意一

般管理與衛生管理，尤其是

氣溫急劇變化、換氣和床面

乾燥等問題。

* * *

養雞近訊

佳里鎮農會為保護養雞戶利益，創辦以臺北大盤價每斤低三角保價運銷雞蛋，並以雞蛋箱輸送，實施以來收效不少，現又購買二噸半卡車乙臺，加強對雞友服務。

由鄉農會一手培養的番路鄉農家養雞，已開始生產雞蛋，雖有商人想要搶購，但雞戶意志堅強，仍由鄉農會辦理共同運銷，參加省農會禽產銷一元化計劃。

由農復會自日本引進本省的肉用種雞業已開始產蛋，擬自五十七年年初起分別在臺灣省畜產試驗所及臺南區農業改良場辦理系統間之相配性檢定試驗。（陳紹純）