

(2)球頭包被，球色白，品質佳。
(3)播種後約七十一至七十五天可收穫，每畝重約一·五公斤。

(4)最遲播種期為九月十號，在貴地二月間播種，播種過遲，因生育後期常遇高溫，致結球常有不齊現象。(李樹泉)

抱子甘藍不可摘心 可連續採收五十天

【問】：(1)抱子甘藍定植後七十天，下部葉葉摘除多少？留多少？
(2)是否要摘心？
(3)植株離地面一寸高即開始結球，可否全部留下？
(4)自開始採收，至採完需幾天？
(5)定植後約七十天，可否繼續追肥？
(6)苗栗縣大湖鄉義和村二十九號賴連安)

【答】：(1)抱子甘藍開始結球後，葉部自然會下垂，而漸次黃變，可將下部黃變的葉，由下往上逐漸摘除，但上部心葉切勿摘除。
(2)不可摘心。
(3)基部不結實的葉球，可早期摘除為宜，若結球充實堅硬者可留著。
(4)通常自開始採收後，可連續採收約五十天。
(5)因抱子甘藍的生育期間長，所以七十天後可繼續追肥。(李樹泉)

【十石】「三國」大豆
可青採當毛豆出售

【問】：(1)雜糧作物園說內之「十石」大豆，是否菜市場所販賣之枝豆？北部栽培適合嗎？
(2)貴刊十四卷十八期畫刊內的圖片，東京南瓜，本省北部採種栽培已經成功，未知何處可買到種子。
(3)甘藍新品種「初秋」品質好嗎？其與「陽春」種比較如何？(臺北縣土城鄉貨儀村十七號廖年厚)

【答】：(1)「十石」大豆適合北部春季栽培，作為黃豆亦可作為枝豆(毛豆)，北部市場之枝豆(毛豆)，多是「十石」或「三國」種大豆，於未成熟之前採收供應市場者。
(2)東京南瓜種子，可向臺北市迪化街二段八十六號「臺灣農產企業公司」洽購。
(3)甘藍初秋品質良好，陽春較差，但不易腐爛。(王進生)

【問】：(1)臺北雜交二號胡瓜須多少日數始能收穫？
(2)追肥單用硫酸銨時，果肉會有何程度的影響？是否會有苦味？
(3)本地有一品種名「烏龍種」(白刺)，收量特多，每條瓜果平均在三至五斤十兩至六斤，但此品種非與種子行有熟的人，是買不到種子，請問其真名稱如何？(臺北縣貢寮鄉和美村和美街七號黃鵬濤)

【答】：(1)臺北雜交二號，自播種至收穫約需六十天。
(2)如施用高濃度之硫酸銨，容易引起苦味，但臺北雜交二號苦味果稀少。
(3)貴地之烏龍種(白刺)，係頂雙溪之系統，普通均在一·二至一·五公斤左右。
(4)臺北雜交二號胡瓜，適於春播(立春前後)。(王進生)

【問】：(1)PPC粒劑與多谷粒劑對水田雜草效果如何？有無藥害？
(2)防治柑桔潰瘍病之藥劑，推廣手冊中：有好實粉或加鏈黴素等，請問鏈黴素是何藥物？與「勃拉益斯」抗生素是否相同？
(3)柑桔紅蜘蛛藥劑中有一種「廢立死」粉劑(推廣手冊介紹)何處有售？(嘉義縣番路鄉江西村柯長全)

【答】：(1)柯長全農友所提問題茲簡復如左：
(1)PPC粒劑與「多谷」粒劑對水田雜草效果都很好，施藥後要繼續保持三分積水十天，效果較好，「多谷」要繼續積水三

【問】：(1)防治柑桔潰瘍病之藥劑，推廣手冊中：有好實粉或加鏈黴素等，請問鏈黴素是何藥物？與「勃拉益斯」抗生素是否相同？
(2)柑桔紅蜘蛛藥劑中有一種「廢立死」粉劑(推廣手冊介紹)何處有售？(嘉義縣番路鄉江西村柯長全)

護保物植

【問】：(1)防治柑桔潰瘍病之藥劑，推廣手冊中：有好實粉或加鏈黴素等，請問鏈黴素是何藥物？與「勃拉益斯」抗生素是否相同？
(2)柑桔紅蜘蛛藥劑中有一種「廢立死」粉劑(推廣手冊介紹)何處有售？(嘉義縣番路鄉江西村柯長全)

【答】：(1)柯長全農友所提問題茲簡復如左：
(1)PPC粒劑與「多谷」粒劑對水田雜草效果都很好，施藥後要繼續保持三分積水十天，效果較好，「多谷」要繼續積水三

世界名牌 原裝進口



英國 好利民 ALLMAN 動力噴霧機
L77型 西德 JLO 引擎
73c.c.3 馬力 重量15公斤

AS MOTOR 西德 愛速牌 AS 1-SL 型 動力噴霧機
75c.c.4 馬力 重量10公斤

用途：噴霧、噴粉、噴粒、噴火、抽水

特點：性能優越、堅固耐用、價格低廉

◀ 徵求經銷處 ▶
台灣獨家 奇特企業公司
總代理 台北市仁愛路四段12巷8弄11號
電話：74637

日本製 進 豬弓蟲病的最新治療藥

克殺弓蟲 (クリサリン)

用賀ヒラキシン研究所出品・砒素劑及色素劑製劑
具有100%絕對效果 每瓶100元



家畜藥品總匯 博濟貿易有限公司
博濟家畜大藥房
臺北市武昌街2段91巷1號 電話36148
郵政劃撥4616 字 戶

免費贈送「付二元郵票」博濟家畜藥品手冊「內容豐富100頁各種疫病與各種新藥品之介紹」每人限一冊及康福利手冊最新新聞各一份。

栽培獲利最多的外銷乾辣椒

純正 三鷹辣椒籽

敝公司由日本輸到原種純正三鷹辣椒種子歡迎照會

臺北市迪化街一段86號 臺灣農業資材公司