


改良四真

大梅花

蘿蔔

可以秋季栽培！



改良四真大梅花蘿蔔

陳培昌

今年的夏季蔬菜，因受五、六月間多雨的影響，產量減少，使菜農們受到了莫大的損失。最近有很多農友來信詢問：「改良四真大梅花蘿蔔」可不可以秋季栽培，他們要提早生產大梅花蘿蔔，來彌補五、六月的雨害損失。

可從八月下旬開始播種

「改良四真」的播種期比較長，自八月下旬即可開始播種栽培，一直到十二月為止。在本省北部，以「冬至」後十天為播種界限，這時期播種的蘿蔔，可以供應「清明」過後的市場。

秋季栽培的產量稍低，但因適為蘿蔔青黃不接時期，市面蘿蔔少，可獲得優厚的栽培利潤。

「改良四真大梅花」多年來遵照農林廳所頒蔬菜良種繁殖方法，每年繼續繁殖原種、原種子，給其採種圃採種。在採種圃並實施田間檢查，經拔除不良植株，因此品種純正，形狀整齊，田間管理容易，採收後的洗滌、調整工作都極為方便。各位如需要種子，可向臺北市南陽街二十三巷五號三樓臺灣農業服務公司購買。

選擇肥沃砂質壤土栽培

「改良四真」適合在肥沃的砂質壤土生長，田間要講究排水，以防雨水為害。

畦寬一·二公尺，溝寬〇·三公尺，每畦種三行，行距四十公分，株距二十五公分，十公畝地（一分地）約九千五百多株。每穴播種四至五粒種子，覆土一公分厚，再用手輕壓。

標準施肥方法，是在犁耕前每十公畝撒施腐熟堆肥一千二百公斤，尿素十公斤，過磷酸鈣三十公斤，氯化鉀十公斤，均勻混入土中。

播種後十五天，在株間作第一次追肥，施用尿素十公斤，氯化鉀十公斤。

至第二十五至三十天舉行中耕、除草，在行間施尿素十公斤，氯化鉀十公斤，然後培土。

栽培期間，還應注意生育情形，如果生育稍差

時，可在噴藥時添加尿素（濃度〇·五%至一%），兼行葉面施肥。

蘿蔔培土，可以防止根部變綠，同時減少風害，必須切實施行。

噴藥·間拔·夜間灌溉

黃條葉蚤體形雖小，但却是蘿蔔的最大害蟲。

成蟲善跳躍，喜食葉片，使點點成斑。幼蟲在地中嚙食根表皮，留下條溝狀的食痕，一般稱為「狗仔皮」，尤其在食痕處附着泥沙，不但洗滌多費時間、工資，在田間時易從食痕侵入各種病菌，發生黑腐病（黑心）與腐敗病等病害，因此，應自犁耕前撒布DDT或「阿特靈」等藥劑來防除。

在生育期間，則應經常注意有無成蟲，選用上列藥劑防治：

（1）二五%DDT乳劑四百倍液，但應在採收前二十一天停止施用。

（2）三五%「安殺番」（「殺蟲淨」）乳劑一千倍液。

（3）五〇%「馬拉松」乳劑六百倍液，採收前四天停止施用。

（4）五〇%「加保利」可濕性粉劑五百至一千倍液，但應在採收前七天停止施用。

自本葉展開後每隔七天定期噴藥，可以兼防蚜蟲、菜螟和夜盜蟲等。

發芽整齊後，本葉二至三葉時，舉行第一次間拔。至五、六葉時舉行第二次間拔，留下最健康的一株。

田間應經常保持適當的水份，尤其在根部開始肥大後，需水更為殷切，應在夜間施行溝間灌溉或在早晨灌水最為理想。晴天中午溫度過高時不應該灌水，以免阻礙生長。

自生長中期以後，如果田間水份時而過多時而過少，則蘿蔔根部會發生裂痕，影響商品價值很大，因此更應注意灌溉，經常保持適當土壤水份。