

【答】：(一)在宜蘭地區可以栽培，宜蘭農校曾栽培過，產量很理想。

(二)草蓴可在十一月定植，繼續管理，到翌年二月至六月陸續採收果實，採收時期多雨會影響收穫，味變淡。因此栽培期間要注意排水，不可灌水。春季、初夏若天候順調，則果實大，味香甜。

(三)如果需要大量草蓴，可向苗栗縣太湖鄉湖村吳昌裕農友洽購。

(四)最近幾年來市場草蓴果實銷量增多，在省內食品加工廠也收購草蓴做果醬。(陳培昌)

養蠶


蓖麻蠶繭質差

目前尚無推廣

【問】：(一)蓖麻蠶目前有何推廣？(二)蓖麻蠶繭質差，何處有種卵？

【答】：(一)蓖麻蠶繭質是否有利，現在若有公司願推廣也有契約，是否可，前途如何。

(二)如利用其葉養蠶，會影響蠶繭子質的收量嗎？(臺南縣白河鎮向水溪五十三號李忠雄)



【答】：(一)蓖麻蠶繭質比一般蠶繭質為差，目前因為目前沒有銷路，所以沒有推廣。

(二)蓖麻蠶繭質，由臺北市公館蠶業改良場保存繁殖，如有銷路，該場會繁殖推廣。

(三)蓖麻蠶子質每公斤售價五至六元。每公頃土地以栽植三千株計算，如成績良好，年可收子質二至三千公斤。蓖麻子質經榨成油後用途很廣，如有適當的土地和自家的勞力，可以作為副業經營，但是對於推廣收購的公司是否健全可靠，則宜慎重調查選擇。

(四)利用蓖麻葉飼養蠶繭，如果採葉得法(採取第三至四次分枝的葉片)對於子質的收量沒有多大影響。(張成基)

水稻

除草劑CPC

使用注意事項

【問】：(一)施用田間除草劑CPC調節水稻生育，是否需與土壤混合撒佈使用？

(二)施用此劑田間水位是否要採取一定？(三)施用此劑要注意那些事項？(新營鎮復興路六十二號陳俊光)

【答】：(一)CPC劑在水田使用時，將原裝之粒劑均勻撒佈於積水稻田即可，不必加土混合後撒佈。

(二)施用CPC劑，稻田表面應積貯三至五公分水深後施用，施藥後田面需保持三至五公分之水深十日才有效，其期間田裏可澆水補充水份，但不可排水。

(三)使用本劑應注意下列事項：

(1)應把握施用時期，本田雜草發生生長到兩葉左右時為施用適期，過早，過遲其藥效均差。

(2)PCP對魚貝類有毒害，因之養魚貝類地區之水田切勿使用本劑。以免排水流入塘池內殺死魚貝類。

(3)要施用本劑之水田，整地時要精耕，田面應耙平，清除前殘留之雜草，提高藥效。

(4)無法保持水(滲透性高)之水田或灌溉不便之稻田，不宜使用本劑。在秧苗軟弱積水過深，插秧過遲等情形下施用本劑易發生藥害。

(5)施用本劑之稻田，應採用合理的基肥或早期施用追肥，並施用本劑後儘量防止攪動水田表土為宜。(林資鑫)

稻葉徒長軟弱

晒田恢復正常

【問】：(一)本地稻作此次颱風豪雨後，大多數的水稻皆呈徒長現象(茂盛)，其稻葉不能直立，有無挽救的辦法？(臺南縣西港鄉劉厝村五號劉保發)

【答】：稻作受颱風豪雨數日後，因陰天缺日照，且受風雨打損易徒長軟弱，若加氮肥過多則稻葉不能直立，發生生育過盛，而影響稻作倒伏，穩產率降低，產量減少等

本秋季日本等國新種子已到齊
天理 日本大和農園出品
交配

大和一號甘藍 (NO.7)

耐暑耐寒抗病力強結球最快50-55天以前可收穫重量二斤半以上。

金力甘藍

耐暑耐寒抗病力強60天可收重量三斤以上。

小玉西瓜

交配種皮綠色黑花紋肉鮮黃每株十五粒以上抗病力強。

綺王西瓜·富研西瓜·ニユーメロン甜瓜·金城甜瓜。

巨豐菠菜·ミカサ菠菜·秋季草花種子防濕原封包數十種。

臺灣總代理：新裕興企業股份有限公司

經銷處：順益種子行
大信農產行
新合成種子行

臺北縣三重市三和路三段七號
臺北市迪化街一段一五九號
臺北市迪化街一段二二三號
臺北市迪化街一段一四九號

其他長岡交配タキイ種苗株式會社各品種現貨供應歡迎惠顧。

青蟲 吊絲蟲

剋星出現了！

請趕快使用速效性，效果大

正豐牌

強力

可樂收乳劑

強力

能敵師乳劑



品質正確



效果優良

正豐化學股份有限公司

霧峰·電話63