



鷄母公西漢祖



鷄母公花藍白

一種方式所飼養者為專用肉雞，即可尼秀公雞交配白芦花母雞所生之後代，飼養八週，體重大約平均一・三及一・五公斤之間，另外一種是商業養雞，專門養可尼秀公雞交配橫斑芦花雞或紐漢西母雞所生之後代，一般人稱之為兼用肉雞。這種雞養到八週重約在一公斤左右，適合結婚宴客用，一般家庭為了經濟，對於上桌的肉雞總是希望在一公斤左右，太大了認為經濟負擔不起，因此兼用肉雞的人大部份都自己直接售與用戶，價錢比較好，而飼養的數量限於兼業大抵不會超過五百隻，至於利用可尼秀公雞交配來航，因為發育慢，不受歡迎，除了沒有信用的雞場外大體是不用的。

兼用種的雞最適合於一般家庭及副業性養雞者飼養。

通常一般人將可尼秀公雞交配白芦花雞所生之後代稱之為九斤雞，或專用肉雞，九斤雞是指養到成熟時公的體重而言，專用肉雞則養至八週即予出售，雖然專用肉雞與九斤雞同為可尼秀及白芦花之後代，但是事實上兩者應該有點區別。九斤雞必須由大型的可尼秀與白芦花所交配，不然成熟後不容易達到九斤重，而專用肉雞則不須要求可尼秀及白芦花之體型大，只要求初期即八週以內發育快就行。

了。

真正的九斤雞應該是中國的上海雞 (Cochin) 才是正宗的九斤雞品種。

九斤雞強制育肥方法，除了藥物外通常將飼料的熱能提高，如飼料配合上玉米、樹諸雞的份量。現在大部份都是利用油脂（牛油或黃豆油）添加於飼料內以便達到飼料高熱能之目的。

所謂完全飼料是指對該期雞隻的各種營養已經很完全的適合其營養需要而言，因此若再加進甘諸雞等物，則會將飼料的平衡打破，即熱能提高，但是蛋白質卻降低了。

為使雞隻得到正常的發育起見，童子雞的飼料粗蛋白質必須維持在十八%左右，不能太低，熱能是每磅飼料在九百至一千卡路里的間。依據畜試所之試驗，樹諸雞代替玉米三十%，或加熱處理後之甘諸代替玉米三十%，都可以得到同樣的效果。不過要加進甘諸雞或樹諸雞之前，我們必須瞭解飼料內的蛋白質和增加後之蛋白質，以便做適當的補救。因為甘諸雞及樹諸雞蛋白質低於玉米，所以一旦使用了，甘諸雞或樹諸雞粉時，飼料內蛋白質含量的百分比會減少，因此須要多增加豆餅粉或魚粉、花生餅粉，以便保持營養的平衡。

麻竹筍

——海江——

麻竹育苗時期，如用埋種法宜在二至三月，如用幼竹分株法應在每年九月初筍發，任其成長為幼竹，至次春三月採取。定植期為三月下旬至四月初。

每公頃栽植株數，平地可栽四百株至五百株，山坡地應減少一半。

栽植法很簡便，如果利用埋種法養成苗，從苗床地將苗掘起時，應將竹節所附老竹材砍除，僅保留竹苗根株，竹苗埋部如過長應予剪短，約留一公尺至一公尺二左右，栽植時應先掘穴，穴大六十至八十公分見方，深約五十公分，栽植時應用肥沃土壤或混以堆肥土，並隨即灌水。竹苗如係自竹叢所採幼竹，最好栽植前用稻草將埋部包裹，以防在新根發生前水份蒸發過快。

留母竹時期為每年白露以後，將位置適當竹筍留存，每株留一至二株，留存竹筍之直徑為二至三吋。若留竹枝數多，則竹叢擴大，竹林內陽光不足，地溫低，發育較慢。

麻竹為何開花，原因至今尚不十分明瞭，不過據一般研究竹類的學者認為可能原因有：

(1) 年齡已達到應開花時期，大約每隔三十至四十年開花一次。

(2) 生理上的變化，例如體內氮素與碳素比例發生變化，這是受環境上如土壤肥力等的影響。

(3) 病蟲害影響。

開花時麻竹的竹葉退化為小片，光合作用減少，正當生理狀況不能維持而枯死。

清除竹頭及培土，應於冬季十二月至一月間掘除竹頭，實行中耕，培以堆肥予以培土，以後到發筍期中仍應隨時培土。

麻竹全年施肥法，可以用下列份量：尿素一・八公斤（氮二）過磷酸鈣三・〇公斤（磷一至一・五）鉀化鉀一・二公斤（鉀一至一・五）施肥時期四、六、八月各施一次。

竹筍前途如何？目前許多農友都很關心，筆者認為竹筍市場一般而言，是樂觀的，因為竹筍除新鮮筍多數供內銷外，竹筍製罐外銷甚為活躍。至於筍干製罐，目前因種種原因可能無大發展。