

四可向農林廳農業推廣教育室或鳳山熱帶園藝試驗分所索取木瓜栽培手冊。
 (四)鳳山熱帶園藝試驗所本身無雜交一號及雜交二號木瓜種子供售。(王德勇)

嫁接葡萄慎選砧木

【問】：(一)據聞葡萄若不經嫁接而直接以優良品種扦插栽培會減少果樹壽命？
 (二)是否會使品種變質？
 (三)是否會影響結果？

【答】：(一)據聞葡萄若不經嫁接而直接以優良品種扦插栽培會減少果樹壽命？
 (二)是否會使品種變質？
 (三)是否會影響結果？

【問】：(一)據聞葡萄若不經嫁接而直接以優良品種扦插栽培會減少果樹壽命？
 (二)是否會使品種變質？
 (三)是否會影響結果？

【答】：(一)大部份的果樹栽培，都是嫁接繁殖，葡萄也不例外，若按極品種與砧木品種親和力強，則不會縮短果樹的壽命，相反的，若親和力弱或沒有，果樹壽命將會縮短，甚至不能嫁接成活。在嫁接繁殖時，應慎選接穗與砧木品種。

【問】：(一)一般來說嫁接後，由於接穗與砧木二方的生理性質不盡相同，是會使果樹變質的。但是這個質的改變，有的是好的改變，有的是壞的改變。
 (二)葡萄嫁接會影響結果。如成熟期早晚，果實品質的優劣，產量的多與少，要看砧木品種而定。

【問】：(一)在葡萄栽培上，有很多品種是用扦插繁殖的。在經濟生產上同樣有價值。巨峯可用扦插前來栽植，玉紫在本省用嫁接較好。
 (二)雲林一帶可以栽植巨峯及玉紫品種。高雄一帶，冬季氣溫稍嫌過高，大規模的經濟栽培要慎重考慮。(康有德)

葛藤

葛藤割蔓可製纖維

【問】：割蔓宜在何時採取，產品在何地有人收購？(士林鎮南雅里二六鄰八六號陳阿東)

【答】：葛藤是一種蔓生植物，野生及栽培之葛藤，長達一·八公尺時均可收割，供作採取纖維原料，簡稱「割蔓」，割蔓時期以五到十月，發生長迅速時為宜。分期採取，每隔四到五週採割一次，一年生葛藤種後，當年可採收二到三次，二年生全年可採收四到五次。

花 棉

【問】：(一)棉花超過一·五公尺高，後期肥料要怎樣分配？
 (二)棉葉是否要拆除，葉折掉後是否影響棉花產量？
 (三)已拆除角葉及雄枝葉是否適當？
 (四)棉粒數可以估計斤數嗎，怎樣估價？
 (五)棉株變赤色(紅狗病)而結實是什麼原因，有防治藥嗎？(嘉義六腳鄉工廠村魏上棟)

【答】：(一)棉花超過一·五公尺，又棉粒三十多粒，則不須再施肥。一般栽培，於發芽二十天就要第一次追肥，再過二十天或三十天，行第二次追肥。
 一般棉田的施肥量(公升/公頃)

種類	基肥	第一次追肥	第二次追肥	合計
硫酸銨	八三	八三	八四二五〇	
過磷酸鈣	一一一	一一一	一一一三三三	
氯化鉀	六〇	七〇	七〇三〇〇	

【問】：(一)在生育期間若不徒長，無需疏葉，在收穫期間，可全部脫葉，但必需在生育一百四十天以後，對產量才無影響。
 (二)不是徒長不必拔除。

【問】：依棉粒數可以估計產量，一棉粒大約有籽棉五公克，若一株有三十粒，即一百五十公克。一公頃若種有二萬株，每株約採三十粒，即約有籽棉三千公斤。
 (一)棉株栽培後期變紅枯死原因：(1)生育自然衰退，終致枯死並非病害。(2)嚴澇浮塵子為害所致，如係這種原因，可噴

防除

吊絲蟲 青蟲


請用新開發特效藥

益利農 乳劑

保賜靈 乳劑

滅蟲靈 乳劑

特級大減速 乳劑



立農化學工業股份有限公司
 台北市南京西路22號 電話：541246、541108

農友們 種植高麗菜 請選用 中、南部已公認

最優良耐暑耐雨 冬季亦絕不抽苔

收量豐富的優良品種

(這次新竹改良場甘藍品種品評會榮獲第一名)

U S ヒ ッ ト 甘 藍

(又名奇美60、奇特、初秋二號)

其他尚有優良品種 初夏蔴エース甘藍

松風甘藍・豐富甘藍

宇治一號甘藍・中早生甘藍

最優良的卷心白菜 坂田濱光卷心白菜

種植期蘿蔔獲利最多 今年還是趁早種植

八江農藝出品的 新黑田五寸人參

西瓜●●日本ミカド交配無籽西瓜(柚皮紅肉)

臺農交配新富光，新富寶，黑皮蜜寶

日本青皮ニューメロン，洋香瓜

西瓜類接木用交配飽仔 每小升100元

(價格表函索即寄)

臺灣農產企業公司

直轄部郵政劃撥12799號 臺北市迪化街一段86號