



適合小家庭消費 新木瓜型小南瓜

——賴森雄——

市面上的南瓜，多數是大果型，主要供作蔬菜或飼料用，品質較差。在小家庭盛行的今日，為適應家庭消費，農林廳種苗場於民國五十三年開始進行南瓜育種工作。五十五年十月，選出果重約一·五—二·五公斤的新果型，與木瓜相近，所以叫做新木瓜型南瓜。新品種植株生育旺盛，葉淡綠色，由播種至果實成熟約七十—九十天。對日照感應遲鈍，每蔓隔五—七節開雌花。果皮為淡黃色稍帶綠紋，果肉金黃色，厚而緻密。子室小，耐貯藏，每十公畝產量約二千至四千公斤。

週年可以播種

南瓜對於溫度的適應性很廣，在平均氣溫攝氏十五—三十度下均可生長發育，但氣溫若超過攝氏三十五度以上，則易發生畸形瓜。若氣溫過低，亦易受霜害，一般日夜溫差大的環境下，形成的果實、品質較佳，因其炭水化合物的消耗較少，澱粉的蓄積較多，糖份較高。南瓜為淺根性作物，對於土質的選擇不嚴格，只要排水良好，日照充足土壤均可栽培，在中性砂壤土最適宜栽培。

南瓜在臺灣平地可週年播種栽培，新木瓜型南瓜最適宜的播種期如下：中部—九—十二月，北部—十二—二月，海拔五百—八百公尺的準高冷地則為二—三月，九—十月。海拔八百公尺以上的高冷地為四—六月。

栽培管理方便

南瓜種子發芽適溫為攝氏二十五—三十度，若在攝氏十度以下或四十度以上則不發芽。故播種時若氣溫過低，可先催芽再播種，催芽時將種子先用八百倍有機水銀劑（如谷樂生、烏斯普龍）浸三十分鐘，再將種子浸在攝氏二十五—三十度的水中二十四小時，然後用濕布包起來，放在較溫暖處，約二—三天即可發芽。每十公畝之播種量約六十一—八十公克。

播種：一般南瓜多採直播方式，亦有先育苗再定植者，育苗時可用土六份

水稻：二化螟蟲、三化螟蟲

死心蟲、捲葉蟲

特效藥。

沙利好M 40% 50%

意大利 **Sariaf** 出品

U.C.B.M 50%

比利時 **聯合藥廠** 出品

水稻：浮塵子、褐飛蟲

特效藥

① 因克靈 50%

② 因克靈 80%

水稻：紋枯病特效藥

滅枯速液劑
紋克速粉劑

柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病

特效藥

維多A (大生78)

維多M (大生22)

因克命80 (大生22)

所有農藥均有登記証

成分正確 · 藥效保證

特力松	(可溶性) 粉劑	80%
滅蟲靈	乳劑	25%
豐谷	乳劑	50%
和豐松	乳劑	46.6%
安谷樂	乳劑	50%
治蟲樂	乳劑	40%
泰山松	乳劑	48%
利百殺	乳劑	50%
萊旺生	乳劑	25%
必有效	乳劑	50%

BHC	粉劑	3%
殺蟲丹	乳劑	10%
蟲必淨	乳劑	50%
(馬拉松)		
和賜靈	乳劑	25.3%
適滅松	乳劑	50%

和力松	乳劑	20%
馬拉松	水和劑	25%
滴着死	水和劑	50%
保谷王	水和劑	85%
BHC	粉劑	1%
適敏	粉劑	1.5%



和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路5號

TEL: 彰化 3518號

堆肥三份，砂一份為培養土，以十二—十五公分×十七公分的聚乙烯袋分裝，每袋播二粒種子，播種深度為三—五公分，育苗期夏天約十二—十五天，春秋十五—二十天，本葉二—三片時即可定植。苗床在低溫期可用白色的聚乙烯布覆蓋，以昇高苗床的溫度，雨季可用砂布覆蓋以防雨水沖刷。

南瓜的生育旺盛，一般種植的株行距為畦寬二公尺，株距一·五公尺，每十公畝種三百五十株。

施肥：南瓜的需肥量較胡瓜少三—四成，十公畝的施用量一般為氮素十七—二十公斤，磷酸十三—十五公斤，氧化鉀十七—二十公斤。

南瓜若氮肥施用過多，易引起徒長，落花落果，同時南瓜亦易發生缺鎂的現象，故每十公畝最好施用七十五公斤的苦土石灰。

一般肥料施用時，氮肥三分之一作基肥，餘三分之二作追肥。磷肥全作基肥，鉀肥三分之二作基肥，三分之一作追肥。一般追肥分三次施用，施於蔓的前方，第一次約於定植後十天，第二次於定植後二十五天，第三次於果實直徑四—五公分大時施下，以後依植株狀況再行施用。

每十公畝（一分地）施肥量（單位：公斤）

肥料種類	總量	基肥	第一次追肥	第二次追肥	第三次追肥
堆肥	八五〇	八五〇			
苦土石灰	七五	七五			
硫銨	八〇	二六	一八	一八	一八
過磷酸鈣	九三	九三			
氯化鉀	三四	二二	四	四	四

摘心：當木葉五—六片時摘心，使其發生側枝四—五枝，任其伸長看果。

病蟲防治：病害以白粉病、細菌性斑點病、軟腐病（危害幼果）、疫病、露菌病、炭疽病、菌核病等發生較多，尤其在多雨通氣不良時最易發生。一般病害的防治為每隔十一—十五天定期噴施「大生二十二」或「新萬生」即可。

蟲害以黃守瓜、果蠅及蚜蟲發生較多，可用「萬靈」防治，殺菌劑可與殺蟲劑同時施用。


耐於貯藏運輸

新木瓜型南瓜於開花後約三十五—四十天果實才充分成熟。此時果梗變為木栓化，且發生三—四條裂縫，果皮面生白粉，果皮與地面接觸部份變黃即可採收。

貯藏：南瓜一般可貯存四—五個月，貯放場以冷涼乾燥、通風良好處較適宜，以免溫度高呼吸作用旺盛，消耗果實貯存之澱粉，致肉質風味變劣。

宿谷牌シクタニ


DM-50 3.3 馬力



背負動力多兼機


噴霧頭

葉下兩側
稻飛蝨剋星



高壓動力噴霧、灌水兩用機

HS-5



（誠徵各地經銷商）



空中旋轉撒雨器

1. 超輕量8公斤
 2. 用單相 $\frac{1}{2}$ 馬力馬達
- ▲本公司備有東海印ビニルホース每丸100m及日製各種特殊噴頭。
 - ▲本公司可負責包辦菜園之噴霧及灌水配管工程。

（備有各型另件供應服務）

代理商 三易行有限公司
臺南市公園路179號 電話：25810