

葡萄

紅冠品種 密植示範

由「巨峯」和「巨鯨」雜交育成的品種，從日本引入，經初步觀察，生長情形及品質與「巨峯」相近。適於密植，豐產，並較耐貯運。五十八年度農復會和農林廳合辦的葡萄改進計劃內，選作爲密植示範的品種。在選用這一品種主要目的，是在介紹密植的方法。至於該品種在台灣各地區的適應性如何，因葡萄的生育及品質的好壞受各地的氣候、土壤等條件及施肥、修剪管理方法的影響甚大，目前還不能斷定。

購置「紅冠」種葡萄苗，可函詢苗栗縣西湖鄉金獅村二十九號彭錦和。



(英火陳)種品九六川井的圓葡萄樹古

或台中豐原鎮田心路田村巷二十二號張皇成。

要生產品質優良的葡萄，必須具備下面的幾個條件：

(1) 土壤排水良好，空氣濕度低。

(2) 果實成熟期白天溫度高，夜晚涼。

(3) 冬天低溫够。

新竹縣沿海崎頂沙丘地，在本省栽培葡萄的地理環境來看，是比較接近具有上面的幾個條件的地方。唯一問題是風害。(張國良)

註：彰化二林華崙里光復路六十號莊秋冬等多位農友來問詢有關紅冠葡萄，請參考。

周年防治病蟲害

葡萄的收穫時期剛要過去，目前品質較好果粒較大的葡萄，市價每斤

高達二十五元，平均也有十餘元。生產葡萄可說是近年來的一種新興事業。

葡萄的品種有數百種之多，一般來說葡萄早熟的品種有早生利貝爾、六月鮮、金香、巨峯、巨鯨和紅冠，晚熟的有貝利A等。品種愈高貴，管理愈困難。

葡萄在本省栽植時期是在冬天至春天之間，最好在冬季尚未發芽的休眠期栽植，較爲適當，繁殖方法有扦插與嫁接二種。選直徑一公分，長二十公分左右的枝條，將其基部平剪，上端斜剪後扦插。

嫁接的方法有舌接、割接的方法有舌接、割

接與芽接等，詳見本刊十八卷二十四期果樹繁殖特輯。
葡萄落葉期需相當的低溫，始能充分冬眠，本省台中以北地區尚可栽培，本省南部地區不宜栽培。
葡萄施肥時期大致可分基肥、追肥與禮肥。包括氮、磷、鉀與石灰等四大要素。葡萄管理作業中，病蟲防治要周年注意，隨時實施：

- (一) 到新曆三月中旬，塗抹石灰硫黃合劑於枝蔓，並誘引枝梢。
- (二) 在五月中，病蟲防除，噴洒加用硫酸鋅的石灰少量式波爾多液二三次，可防治黑痘病，另噴洒DDT水溶劑，可防除猿雜蟲及浮塵子類。
- (三) 在六月中，噴射石灰少量式波爾多液，三十五次，白粉病可加水和硫黃劑。害蟲，可加用砒酸鉛劑或DDT於波爾多液中。同時並搜集透翅蛾及被害枝條燒毀。

(四) 在高溫乾燥期，黑痘病及白粉病發生少，對於歐洲種要注意褐斑病、銹病、及晚腐病的發生。搜集燒毀被害枝。(栗鴻蘭)

▽ 葡萄黑痘病的防治法是發芽前撒布○・三%PCP加硫黃合劑五十倍液，落花後可撒布六一三式波爾多液。葡萄開花期宜避免噴藥，以免遭致落果。(蘇鴻基)

▽ 巨峰葡萄可用接枝或扦插繁殖，灌水不便土地乾燥地，用接木法較安全，土地灌溉方便含水分多者，宜用扦插法，但扦插法將來對根芽蟲無

- 本刊即日起接受三年份及二年份訂戶，並有獎徵求介紹訂戶。
- 優待長年訂戶，二年份七十元；三年份一百元。(一年份：四十元，半年份：廿四元)
- 今年七月一日起至九月底止，任何人徵得「豐年」全年訂戶五份以上時，除照代銷獎勵辦法給予獎金外，另贈送下列獎品(半年份以半份計，二年份、三年份各以二份、三份計算)
- 五份—豐年麻紗圓領衫一件
- 十五份—大同10-1型電殺蟲器一個
- 三十份—高級襯衫一件
- 一百份—大同H-601電晶刀一個
- 五百份—大同DS-14豪美型電風扇一架
- 四百份—大同交直流兩用電晶體收音機一架
- 三百份—大同TPH-6A型電唱收音機一架
- 一千份—大同TV-19FK型電視機一架
- 介紹人匯寄訂費時，請填明介紹人姓名及詳細住址。
- 介紹人請將訂費存入本刊郵政劃撥儲金帳戶台灣五九三〇號。並請在劃撥單背面通信欄填寫訂戶姓名住址，以便按期將本刊直接寄給訂戶。