

簡介

楊桃栽培

— 李信芳 —

楊桃古稱五稜子或五斂子，果實長橢圓形，果面帶有顯明五條或四條稜狀隆起，因此而得名。本省俗稱羊桃。另有一種長葉五斂子，亦名木胡瓜，形狀相同，是為其同屬近緣植物之一。

型態

楊桃原產馬來，為熱帶性果樹。我國漢代即有栽培，以廣東、福建為多。


常綠小喬木，羽狀複葉，枝條濃密下垂，樹高可達八公尺左右，形態美觀。花小淡紫，果實金黃，豐產而採收期長。筍前屋角，隨處可栽，管理粗放，具有遮蔭、觀賞及果樹兼用等價值，因此為台灣普遍常見的庭園果樹之一。

楊桃品種，一般分甜味及酸味兩大類，大致甜味種花淡紫，果實黃色較大



《北市農藥字第0292號》

請向各地農藥行購用



三菱石油噴霧乳劑 三菱石油スプレー油

四季都有效

主要成份：強力精製馬辛油97%

專滅：“柑桔類及果類、茶樹、杉木等”紅蜘蛛、介殼蟲等
“杉林”圓殼蟲、刺粉蟲，防除特效聖藥。

※全天候：任何季節（春、夏、秋、冬）都可施用

出品廠：日本三菱石油株式會社
台灣總代理：順商貿易有限公司
台北市武昌街一段39號 TEL. 22629 · 378662

，多供生食。酸味種花深紫，果濃黃略小，多作加工。台灣據載舊有爪哇種、新嘉坡種、廣東種及福州種等分別，普通民間則有蜜桃、酸桃、白絲青鼻、薄念、抱念、軟枝、四季無子蜜斯桃等俗稱。

性狀缺少正式記載，或經多次種子繁殖而生變異，因此頗多同物異名或同名異物之誤。就目前中部栽培較多的品種，概略可知有四：

(一) 軟枝種——為近年來彰化縣二林鎮附近農家發現的實生變異種，豐產果大，纖維較少，味甜多汁，風味頗佳。

(二) 薄斂種——稜線不明顯，果小渾圓卵形，俗稱薄念或抱念，可能為同種異音，味酸而風味略差，唯極豐產。

(三) 至尾種——可能為薄斂的實生變異種，性狀頗類似，果實尾端微歪，為其特徵。

(四) 廣東種——果形頗大，味甜多汁，風味極佳，唯果實易遭虫害為其特徵。

缺點。

甜味種用種子繁殖，容易變酸，

正式栽培，宜用共砧木，播種用新鮮

者為佳，約二、三年砧實施切接或靠

接，大樹更新高接也易成活。定植距

離視土質肥瘠，採三至四公尺正方形

栽植，定植後約四至六年始開花結果

，盛果期年產量可達五十公斤以上。

充，化學肥料可酌情於開花前或結果後追施二、三次，磷鉀肥宜多。

病害方面較少，唯成年樹應注意

天牛類為害主幹。

果實宜逐日儘早擇微黃熟者採收

，並可促進未熟果的膨大。

若選擇保存優良母樹，以改良鮮

果品質，及發展加工外銷途徑，楊桃

仍不失為極具前途的果樹。

* * *

石螺草魚養殖

定植後即宜自主幹距地面六十公分左右一次剪定，以促進發生三至五

主枝，此後可放任生長，發生多數側

枝。樹冠容易構成自然圓頭型，普通

僅需注意徒長，衰老及過密枝條，實

施疏剪修剪，以利通風透光，若修剪

過甚，影響枝葉不足，反而有碍生育

結果。

開花・結果

楊桃的結果枝纖細下垂，花序短圓錐形，多着生於老枝之側或已落葉

的葉腋，自六至九月間開花，七月至

翌年一月成熟，結果繁榮，採收期長

，因此豐產期樹多用竹棚支柱，以免

風害或果實重壓，使枝幹折裂。

甜味種多鮮果出售，酸味種通常

切片糖浸或塗漬，街頭巷尾，到處可見，為一極大衆化的果品。部分亦製

作罐頭，輸出國外。據說其枝葉及根

，可做中藥。

管 理

由於楊桃栽培容易，豐產價廉，一般管理僅須注意冬季有機質肥的補

苗栗縣頭屋鄉獅潭村六三號陳豐
林農友，來函詢問有關石螺及草魚養殖問題，請參考。

武田農藥

最新型柑桔蔬菜病害防除抗生物質劑

**濃厚
武田マイシン®**

- | | |
|---------|-----|
| 蔬菜： | 軟腐病 |
| 柑桔： | 潰瘍病 |
| 蕃茄、馬鈴薯： | 疫病 |
| 菸草： | 野火病 |
| 洋蔥： | 腐壞病 |



武田藥品工業株式會社

立農牌農藥成份最可靠，效果最佳！

益農靈治	乳劑.....蔬菜：吊絲蟲、夜盜蟲。
樂果	乳劑.....蔬菜害蟲
強力樂果 (大滅速)	乳劑.....蔬菜害蟲，西瓜螟蟲。
美速得愛 (Metasystox(i))	乳劑.....果樹：潛蛾、紅蜘蛛等害蟲

阿斯巴
(ASPOR)

可濕性粉劑.....蔬菜，果樹病害。

所有農藥皆有登記証



立農化學工業股份有限公司