

# 栽培苦瓜收益好！

陳旭雲

苦瓜是夏季的一道好菜，在炎熱的夏日，苦中帶甘的苦瓜湯，真能消除暑熱，增進食慾。苦瓜是夏秋間的蔓性植物，它生產成本低，只要人力豐富，管理得法，獲益是很大的。

## 栽培時期

夏作：四月五月播種（第一期水稻收穫後）  
秋作：九月十月播種（第二期水稻收穫後）

在寒冷時生長不良，開花期遇長期降雨，着果不好。

## 育苗・整地

栽植前約二星期用塑膠袋育苗，至水稻收穫後移植在田間。

水田裏作：做高於五十公分的土堆，每處播種二粒或移植苗一株。

旱田栽培：做高畦，施用基肥後栽植。

## 栽植距離

旱田栽培：做寬四公尺的高畦，栽植二行，株距為一·二公尺，每分地約栽植四〇〇株。

水田裏作：水稻收穫前或收穫後，行距水稻八行，株距水稻五行，每分地約四〇〇株。

## 施肥・摘心


施肥要領和其他瓜類相同，每分地施肥量如下表：（單位：公斤）  
每株另加約半斤的雞糞有顯著的效果。

數量	基肥	追肥		
		第一次	第二次	第三次
堆肥	1,500	1,500	—	—
硫酸鉀	75	25	5	20
過磷酸鈣	45	30	5	—
氯化鉀	20	10	10	—

(1) 白粉病：高溫高濕時較易發生，葉柄和葉片均會發病，葉面有白色粉末，繼而變黃枯萎。在發病初期開始施藥，施藥時應噴射葉片上、下面。藥劑可在下列三種中任選一種使用。

(2) 二五%「魔立死」可濕性粉劑一千倍液，連續噴一次，連續三至四次。

## 主要病蟲害



苦瓜（陳培昌）

雌花着生在孫蔓，因此必須施行親蔓摘心，以促進着果，提早收穫。親蔓本葉四至五葉時摘心，子蔓留三至四葉，子蔓長約一公尺時再行摘心。

## 其他管理

(1) 摘蔓：苦瓜生育繁茂，如無適當的摘蔓，結果反而不好，也會使全株苦瓜因肥分不足而提早枯萎。

(2) 蘭草：水稻收穫後應挖溝以利灌排水，畦溝要深，把土挖於圃上，圃面鋪滿稻草，以防瓜果直接觸到地面。

(3) 灌排水：生育期中畦溝可經常保持濕潤，苦瓜結果後，不喜雨水，降雨時要使水疏導出去，千萬不可積水太多。

(4) 其他管理：苦瓜幼果畏強烈陽光，強烈陽光照射太久，不但使瓜果變成淡綠色，苦味濃而且會把它晒焦，使價格降低。

因此，當瓜果結成後，要設法使它藏在蔭影裏，能用葉蓋住最好，否則該用報紙或水泥包紙包起來，結出白蕊似的瓜果售價高，又可減少瓜實蠅的侵害。

(1) 白粉病：七〇%毒線虫乳劑每分地二·八公升。八〇%滅線虫乳劑每分地十公升。滴滴滅液劑每分地二〇公升。

(2) 瓜實蠅：二五%馬拉松可濕性粉劑及蛋白質水解劑四〇〇倍液，自開花結果後每隔五至七天噴一次。

(3) 根線虫：七〇%毒線虫乳劑每分地二·八公升。八〇%滅線虫乳劑每分地十公升。滴滴滅液劑每分地二〇公升。

(4) 蚜蟲：五〇%D D V P 乳劑一千倍液五百倍，加用五〇%「馬拉松」乳劑六百倍，每隔五至七天噴射一次，連續三次。

(5) 瓜實蠅：二五%馬拉松可濕性粉劑及蛋白質水解劑四〇〇倍液，自開花結果後每隔五至七天噴一次。