

黃梔子芳香無比

邵淑平

黃梔子種類繁多，為茜草科(Rubiaceae)，黃梔子屬(Gardenia, Ellis)常綠小喬木，灌木或短灌木，在本省北部栽培有少許落葉，為香花植物之一種，有觀葉及觀花種。

黃梔子葉對生或三片輪生，帶光澤，葉形有卵葉、橢圓葉、狹葉、倒披針葉等形式，深綠色，全緣。花腋生或頂生，有單瓣及重瓣花，盆狀或筒狀形，繖房花序，花期四至六月，初開呈白色，漸轉黃色而凋萎，芳香無比，可供香料或煉茶用，果實肉質長橢圓形，成熟時為紅色。

品種

單瓣黃梔子(*Gardenia jasminoides*, Ellis)：別名山黃梔。原產中國、日本，常綠小喬木或灌木，高約十尺許，為大葉單瓣花種，葉長橢圓或披針形，長約九至十公分，寬約三至四公分，全緣對生具光澤。新枝

青綠色，老枝褐色。花腋生或頂生，白色六瓣，雌蕊黃色，直徑約六至七公分，花梗長，有花托，芳香，本省山坡地甚多到處可見。


重瓣黃梔子(*Gardenia jasminoides*, Ellis. Var. *ovatifolia* Nakai)：為大葉重瓣花種，單瓣黃梔子之變種，性狀特徵大致相同。僅葉較寬圓些，花重瓣大輪，形美，芳香，最為愛花人士所寵愛，適合盆栽及園景種植觀賞，本省栽培甚廣。

重瓣雀舌花(*Gardenia radicans* Thunb.)：別名水梔子。原產中國、日本。常綠灌木或短灌木。為小葉重瓣花種，高約三至四尺，易生側枝。葉倒披針形，深綠色，長約七至八公分，寬三公分，對生或三片輪生，

花重瓣白色，直徑約五公分，芳香。此種由於不易高大，葉小枝多，最適合盆景之製作或盆栽、園景栽培觀賞，本省普遍種植。

單瓣雀舌花(*Gardenia radicans*, Var. *simpliciflora* Nakai)：為小葉單瓣花種，重瓣雀舌花之變種，性狀特徵大致相同，惟葉較窄些。花六瓣，直徑三至四公分，芳香，適合盆景、盆栽及園景種植，本省栽培廣。

黃斑雀舌花(*Gardenia radicans* Thunb. Var. *Variegata*, Carr.)：短灌木，亦為重瓣雀舌花之變種。莖橫臥而生，側枝多，高約三〇至四〇公分。葉倒披針形，帶不規則黃邊或黃斑。花白色重瓣，直徑約三公分許，芳香，為雀舌花之佼佼者。兼具



上：重瓣雀舌花 中：單瓣雀舌花 下：黃斑雀舌花

觀葉觀花價值，適合盆景、盆栽及園景之栽植觀賞，本省栽培多。

栽培管理

黃梔子性喜高溫潮濕，日照充足，排水良好之地。土壤以稍黏之壤土為佳。因品種而異，有些不易結實，故通常採用扦插法繁殖。於春秋兩季先將苗床中耕、拔草、翻土、打碎、作畦、使土壤鬆軟。再選擇充實成熟之越年生枝條，用鋒刃之剪定鋏剪取長約二〇至二五公分插穗，斜插三分之二於苗床土內。行株距以一五公分為宜，太密管理不易，影响成活率。然後壓緊插穗四周土壤，充分灌水。平時管理工作宜注意雜草拔除，以免動搖插穗，保持土壤濕度，成活率可達九十五%以上。待新苗長高約一〇至一五公分時，即可移植。移植



上：重瓣黃梔子 下：單瓣黃梔子

前亦需先行將苗圃畦中耕、除草、打碎、作畦，畦寬二尺許，長度依地形而定，以株距四〇公分，行距五〇公分挖穴，穴寬深皆三〇公分，放置腐熟堆肥或基肥一斤與土攪拌。
再將花苗挖出，剪去新枝三分之一，根部如過長或過寬宜略加修剪，放置穴中覆土壓緊，充分灌水，夏季炎熱宜早晚洒水，保持土壤濕度。
梔子花栽植一、二年後，植株即已茂盛，為保持樹型完美，生長強健，開花多而香，宜注意修剪施肥噴藥工作。修剪應將過密枝條疏剪，枯弱，接近地面，或過長之枝條剪去，以利空氣流通，陽光照射。每年於春秋兩季各施花卉複合肥料一次，以環施為佳。
如有夜盜虫為害葉面或花蕾，需噴洒「萬力」當可防治。

栽培楊梅

應紹舜

不久前，國畫大師張大千從美國返國定居，特自美國帶回楊梅兩株，交台灣省林業試驗所育林系實驗苗圃培育，計畫俟此楊梅長大後，以接枝方式繁殖，作全面推廣，並選擇若干山坡地區示範栽植。

台灣產楊梅，多為野生，很少有人栽培，不僅果球小，且味酸澀，極待有關研究機構育種改良。

楊梅屬於楊梅科的多年生灌木或小喬木，最高可達七公尺，樹幹平滑，老時具有淺裂。葉

互生、單葉、倒卵狀長橢圓形或倒披針形，先端鈍、厚革質、具有短柄。花雌雄異株，因此在栽植楊梅時須注意其性別，應多植雌性植株，雌性者僅種一、二株即可。花序着生於葉腋，多於三、四月間開放，雄花序呈赤色；雌花序較短，紅紫色。

果實為核果，六、七月間成熟，球形，直徑大者可達二公分。外果皮暗紅色，由多數之囊狀體密生而成。內果皮堅硬。

楊梅的品種很多，如早酸梅、鈕珠梅、荔枝梅、水紅梅、雲梅及荸薺梅等。
其中早酸梅成熟最早，味酸為利用種子繁殖的結果，其他則大多使用接木法育成的品種。其中雪梅及荸薺梅的品質最佳。

楊梅除果實供食用外，其木材堅實，雖於割裂，心材暗紅色，邊材淡褐色。因此木材可做鑲工用材及薪炭材。除此之外，樹皮富含單寧，為一良好赤褐色染料。



楊梅

根據我國古籍羣芳譜云：「楊梅種植宜山地，核投糞池中，浸六月取出，收潤土中，二月鋤地種之，待長寸許，次年移栽，三、四年後以生子枝接之，次年仍移植地，多留宿土，臘月內移根四、五尺，於高處開溝灰糞壅之，不宜着根，每遇雨，肥水滲下，則結子而肥。」
於七月間採集成熟的果實，放置桶中，搗碎堅硬外殼，取壳內的種子，混以土砂儲藏。翌春，取出播種，要時加灌水，以防乾燥。次年移植，五、六年間，樹幹大如拇指，可充砧木。
楊梅的接木一般多採用切接法，在春初一、二月行之。芽接則在八、九月行之。
楊梅在台灣來說，可算是一種新興的果樹，只要你在山麓地區一〇〇至一、〇〇〇公尺間有空地，不妨試着去栽植，只要幾年下來，將有意想不到的收穫。