

觀葉觀花價值，適合盆景、盆栽及園景之栽植觀賞，本省栽培多。

栽培管理

黃梔子性喜高溫潮濕，日照充足，排水良好之地。土壤以稍黏之壤土為佳。因品種而異，有些不易結實，故通常採用扦插法繁殖。於春秋兩季先將苗床中耕、拔草、翻土、打碎、作畦、使土壤鬆軟。再選擇充實成熟之越年生枝條，用鋒刃之剪定鋏剪取長約二〇至二五公分插穗，斜插三分之二於苗床土內。行株距以一五公分為宜，太密管理不易，影响成活率。然後壓緊插穗四周土壤，充分灌水。平時管理工作宜注意雜草拔除，以免動搖插穗，保持土壤濕度，成活率可達九十五%以上。待新苗長高約一〇至一五公分時，即可移植。移植

前亦需先行將苗圃畦中耕、除草、打碎、作畦，畦寬二尺許，長度依地形而定，以株距四〇公分，行距五〇公分挖穴，穴寬深皆三〇公分，放置腐熟堆肥或基肥一斤與土攪拌。

再將花苗挖出，剪去新枝三分之一，根部如過長或過寬宜略加修剪，放置穴中覆土壓緊，充分灌水，夏季炎熱宜早晚澆水，保持土壤濕度。

梔子花栽植一、二年後，植株即已茂盛，為保持樹型完美，生長強健，開花多而香，宜注意修剪施肥噴藥工作。修剪應將過密枝條疏剪，枯弱，接近地面，或過長之枝條剪去，以利空氣流通，陽光照射。每年於春秋兩季各施花卉複合肥料一次，以環施為佳。

如有夜盜虫為害葉面或花蕾，需噴洒「萬力」當可防治。



上：重瓣黃梔子 下：單瓣黃梔子

栽培楊梅

應紹舜

不久前，國畫大師張大千從美國返國定居，特自美國帶回楊梅兩株，交台灣省林業試驗所育林系實驗苗圃培育，計畫俟此楊梅長大後，以接枝方式繁殖，作全面推廣，並選擇若干山坡地區示範栽植。

台灣產楊梅，多為野生，很少有人栽培，不僅果球小，且味酸澀，極待有關研究機構育種改良。

楊梅屬於楊梅科的多年生灌木或小喬木，最高可達七公尺，樹幹平滑，老時具有淺裂。葉

互生、單葉、倒卵狀長橢圓形或倒披針形，先端鈍、厚革質、具有短柄。花雌雄異株，因此在栽植楊梅時須注意其性別，應多植雌性植株，雌性者僅種一、二株即可。花序着生於葉腋，多於三、四月間開放，雄花序呈赤色；雌花序較短，紅紫色。

果實為核果，六、七月間成熟，球形，直徑大者可達二公分。外果皮暗紅色，由多數之囊狀體密生而成。內果皮堅硬。

楊梅的品種很多，如早酸梅、鈕珠梅、荔枝梅、水紅梅、雲梅及荸薺梅等。其中早酸梅成熟最早，味酸為利用種子繁殖的結果，其他則大多使用接木法育成的品種。其中雪梅及荸薺梅的品質最佳。

楊梅除果實供食用外，其木材堅實，雖於割裂，心材暗紅色，邊材淡褐色。因此木材可做鑲工用材及薪炭材。除此之外，樹皮富含單寧，為一良好赤褐色染料。



楊梅

楊梅的接木一般多採用切接法，在春初一、二月行之。芽接則在八、九月行之。

根據我國古籍羣芳譜云：「楊梅種植宜山地，核投糞池中，浸六月取出，收潤土中，二月鋤地種之，待長寸許，次年移栽，三、四年後以生子枝接之，次年仍移植地，多留宿土，臘月內移根四、五尺，於高處開溝灰糞壅之，不宜着根，每遇雨，肥水滲下，則結子而肥。」