


小胡瓜品種介紹

王進生

小胡瓜俗稱花瓜，適於生食、炒食及加工。以本省氣候條件，周年可以生產，而且需求亦是周年性。小胡瓜較大胡瓜耐高溫，是不可缺少的夏季蔬菜。

春燕



飛燕

小胡瓜的生育迅速，自播種至採收開始僅需三〇天左右。本省夏季驟雨頻繁、高溫多濕，栽培雖有風險，但價格不賤，仍有利可圖。為減少栽培的風險，減輕生產成本，務須注意左列事項。

品種選擇

小胡瓜品種均為長日性，不受日照時間而影響雌花出現率。適於夏季栽培的品種，須具備早生性，即植株雌花早期出現開花着果。例如主蔓的第五、八節開始着生雌花，子蔓於第一、三節着生雌花的品種。

如植株生育強健，每株能採收二公斤以上幼果的多產型，並具有抗毒素病，加上可視市場的價格也能轉為採收大胡瓜的兩用品種更佳。

以往本省的小胡瓜品種大半仰賴日本進口，現在本省已育成很多的優良品種，無論品質、產量及抗病性，比進口的毫無遜色，甚至較日本品種為優。現將優良品種介紹如左。

1. 農友春燕：本品種極早生，生育迅速而強健，葉片小而直立，側枝雖多但甚短，通風良好，露菌病、白粉病發生少。本品種對於毒素病的抵抗力特別強，生產安定。

主蔓、子蔓均能着生多數的雌花，採收適期的果長在十八、二〇公分，每果重約九〇公克，果色濃綠，稍有果粉，果面疣刺稍大，白刺，品質

與產量均優。

2. 農友三二號：早生種，抗毒素病，生育旺盛，葉片小，節間短，着果習性以子蔓為主，主蔓的雌花着生數少。子蔓中長，分枝上雌花多，無須摘心，因是側枝着果，致着果期稍晚。

採收適期的果長約二二公分，果重一〇〇公克左右，果色翠綠，果面平滑有光澤，果刺少且小，稍有果粉，本品種以果型及果色最好而著名。


3. 飛燕：極早生，生長特別旺盛，分枝尤多，開花後六、一〇天左右為採收適期。果型細長整齊美觀，果長二三公分左右，果色青翠，刺白色，肉質脆嫩，產量頗高。因抗露菌病的關係，適於露菌病易發生的季節栽培。

4. 萬燕：中早生，植株強健，以分枝着果為主的品種。果型較長且端直整齊，果長十八公分，果重八〇、九〇公克左右為採收適期。果有白刺，果皮色青翠鮮艷，果面光澤美觀，品質極優。抗毒素病，露菌病和白粉病發生少，產量高穩，適應性廣。


5. 新市三號：中早生，主蔓及分枝均會着生雌花，分枝中等。瓜果肥大快速，形狀大小均端正，果色青翠艷美。採收適期的果長約一九公分，果重約八〇公克，肉質脆嫩。

本品種的特點為可視市場需求，採收大胡瓜出售。如改採收小胡瓜，應於主蔓第十一、十三節開始，將略同時開花者留三、四果，以利果實的均一發育。

大胡瓜的採收適期為果長三二公分左右，直徑約七公分，果重九〇〇公克時，品質優美，產量高。



萬燕



農友三二號

以上均為本省所育成的第一代優良品種，至於日本優良的品種計有松風、新松風、S二〇四號、齊幸、夏珊瑚等。因均須進口，不再一一介紹特性。