




(李賢德)

幼虫蛀入假莖、葉梗、果軸內，縱道縱橫，便利其他昆蟲及病菌的入侵。滅弱假莖、葉梗及果軸的支持力，導致蕉株倒折，果房斷落。嚴重程度可由蕉株外表的流膠及虫孔多少判斷。

台灣香蕉研究所，以四〇多福絲本乳劑一、〇〇〇倍稀釋液，取代以往使用的焦特克，灌入半自動式噴霧器，噴桿前方接上特製設計的五孔針

頭，由虫孔下方十公分處，偏心插入，避開假莖中央部份，以免藥害。注射量為每株一五〇CC，約為五、七秒鐘的流量。



對成虫及幼虫的防治率均可達到八五%以上，經濟又有效，每株所使用的藥劑費用，約為新台幣〇・二元，並且沒有殘量餘留問題，但採收前一個月內，必須停止使用。
注意事項：將假莖寬度，區分為左、中、右三等份，左右兩側可安全注射，中央是藥害發生區，絕對不可插入中央生長部份。
初次注射時，應要求青果合作社或香蕉研究所派技術人員指導。

香蕉球莖象鼻虫

此虫在全省蕉園均普遍存在，幼虫蛀食球莖，為害情形與假莖象鼻虫一樣。
成虫於夜間活動、交配。常產卵於新植苗，卵孵化後，幼虫食去蕉苗

品種可靠 大豐

增加收益 種子

一代 長豐胡瓜

最新育成超級大瓜品種，極抗各種病害，生長健壯，着果力特強，果實肥大整齊一致，果皮深綠色，白刺果面帶粉，果長約30公分，肉質堅嫩，極耐運輸及貯藏。

本省南部全年均可下種，中北部及東部2~8月下種，株距75×50公分，畦高20公分畦溝經常保持水分基肥充足至採收期經常注意追肥及加強灌溉，開花後25天即可採收。

一代 長綠胡瓜

最新育成大瓜用新品種，超抗毒素病、露菌病、生長強健、早生、果實肥大，果皮呈濃綠色微粉白刺，果長30公分，直徑8公分，肉質肥嫩產量特高，極耐運輸及貯藏。

本省南部全年均可下種，中北部及東部2~8月下種，株距75×50公分，畦高20公分，畦溝經常保持水分基肥充足至採收期經常注意追肥及加強灌溉，開花後25天即可採收。

大豐種子行

郵政信箱：高雄423號

電話：(07) 213101~2・265878

郵政劃撥：40277・12839

(全省各大種子行均有銷售)