


辣椒

不結果

• 農家 •



有些種植辣椒的農友發現所種的辣椒，雖然花芽分化相當多，開花也正常，却幾乎全不結果，花謝了，整株便枯黃凋落。

辣椒喜溫暖乾燥氣候，生長適溫在 25°C 左右。如溫度低於 15°C ，不易結果或果形不良種子稀少。溫度高於 32°C 時蒸散作用太快不易授精，結果。另外，水分供應失調或空氣太乾燥時，極容易引起落花落果。

但是這些原因並不至於全部不結果。全不結果的嚴重情形，常由於噴藥不當所致。過量或不適期的噴施殺虫劑、荷爾蒙、殺草劑，反而會產生藥害及反效果。

為使結果良好，應改正噴藥種類及濃度，注意排水，維護根羣發育，並施用有機肥料如堆肥等。此外，要避免病虫害的發生。

高溫及排水不良易生青枯病，應選地下水位高的土地栽培，多施石灰以中和土壤酸性，並注意輪作。疫病由土壤或空氣傳染，在高溫期容易發生，應用錳乃浦、蓋普丹藥劑噴洒，畦面覆草。軟腐病也在高溫期發病，病菌多由傷口侵入，應實行輪作，防治虫害，減少傷口傳染，並噴布農徽素等抗生素農藥。

藥害、生理障礙（如缺少某種元素）或毒素病都會引起心葉捲曲萎縮。

※ ※ ※

大克菌靈[®] (大克爛)


50%可濕性粉劑

農藥許可證：經市進字第1151號




作物種類	病害種類	防治時期	使用倍數	施用法
草 菇	菇床白絹病及雜菌	菌種成活後 未發菇前	3000	每坪用稀釋液1公升，雜菌嚴重時採用2000倍，但不可用1000倍
高 芭	菌核病	種後 20~30天 發病初期	2000	每7~10天一次 連續3~4次

大克菌靈防治白絹病效果



大克菌靈對草菇增產效果



(資料來源：台灣省農業試驗所66年委託試驗報告)

製造工廠：
英國 The Boots Company Ltd.
總代理：

嘉寶有限公司

台北市郵政信箱3339號