

園藝新知



外銷園藝作物

生產改進計畫

- ① 20%速滅精乳劑加水3,000倍。
- ② 10%吉斯靈乳劑加水2,000倍。
- ③ 25.3%美文松乳劑加水500倍。
- ④ 90%納乃得可濕性粉劑加水2000倍。
- ⑤ 75%加保扶(如好年冬)可濕性粉劑加水1,500倍。
- ⑥ 40.6%加保扶精(如好年冬精)加水1,000倍。
- ⑦ 50%陶斯松(如毒絲本)可濕性粉劑加水1,000倍。
- ⑧ 35%安殺番乳劑加水1,000倍。
- ⑨ 50%達馬松溶液加水1,000倍。
- ⑩ 50%二氯松(如立斃)乳劑加水1,000倍。
- ⑪ 58%乃力松乳劑加水1,000倍。

紅蜘蛛：芋在生育期中受紅蜘蛛為害時，由於紅蜘蛛羣居葉部，吸食葉片汁液，使葉片皺縮乃至枯乾，植株生長停滯，影響產量至鉅。故在生育期中，



芋的污點病

應注意防治紅蜘蛛的發生與漫延。

防治法：生育期如有蟲害發生時，選用下列藥劑每隔5~10天輪流交換噴藥一次為原則。

茄子接木・預防青枯病



永靖鄉農會 曾瑞桐

為減少本省茄農受茄子青枯病侵害損失，永靖鄉農事研究班進行接木試驗，現在已有成果，並正在繼續觀察中，如果茄果形態、品質、抗病力沒有變異，就可以推廣施行，屆時因青枯病的減少，茄子產量可大為提高。

接木試驗是以本省的胭脂茄為接穗，日本的赤茄子為砧木。胭脂茄茄果美觀、品質優良、豐產，赤茄子抗病力強、根幹強壯、親和性好。

春天播種時，用於接穗的胭脂茄要比用於砧木的赤茄子早7天播種。

接木的方法是：以帶頭、莖插接法。

將已生長15公分的二種茄苗連根拔起。砧木留本葉一片，切除節上端，然後將預定插接的側面外皮輕輕剝削，使剪口向斜下剖入1公分左右，到木質層為止。接穗切除本葉一片，同樣輕輕剝削皮層後，即向主幹斜上剖開1公分到木質層為止。而後將二株插接密合。

密合後，以接木鉗挾定，移到假植苗床假植，注意澆水及陽光的遮蔽。大約10天左右，接口癒合，細根伸長、旺盛，此時放開接木鉗，移到本圃定植。