

動物尾巴各有妙用

水獺用尾巴拍水面，附近同伴會躲向安全地帶。

非洲小羚羊無時無刻都搖着尾巴。但如遇到獅子或土狼出現，尾巴便短暫的靜止，在它的同伴却是最大的警告。

北美馴鹿間的聯絡，除利用尾巴的揮動外，還靠尾巴基部一種腺體發出麝香似的味道。遇有危險會豎起尾巴，先兜幾個圈子，然後才一溜煙的跳走。

山狗在激動或動情時會將尾巴高舉。表示順服時就把尾巴放低且快速而小幅度地搖動着。

雄孔雀在求偶時展開它美麗的尾羽到處炫耀。

響尾蛇會搖動尾巴發出響聲警告外敵不要踩它。

松鼠膨脹的尾巴有助于平衡。同時在揮動愈快時，表示愈加緊張的程度。

鱸魚用尾巴將獵物打倒，成了捕食的工具。

一些蜥蜴的尾巴被抓住時，尾巴就會自動脫落而逃難去。（摘自「自然」9月號）

台灣海邊養蚵縮影

很多沿海居民都以為蚵是由海水泡沫，加上水中污泥，附在某種物體後變成的。其實蚵苗是由肉眼看不到的蚵卵受精後發生的。蚵必須附着在半淡水半鹹水或海水中某種物體上始能生長。蚵的最適合海水比重是1.02左右。最適合的溫度是15.8~32℃。蚵在此環境下終年能生長和產卵。

台灣養蚵面積大約有3千公頃。年產鮮蚵肉約1萬公噸。據估計97%是用刺竹片長35~100公分，寬3~5公分的「簾」，在每年10月至次年2月間插入海潮線起以下或以上2~7公尺處。這種竹片製成的「簾」最好先用雜酚油處理過，以減少船蟲之害。

插簾的方法是把簾的全長深入地盤下1/2~3/4，俟附着蚵苗後再慢慢地將簾拔高，使它在地下部分減至全長的1/2~1/4。如此方式大多數每公頃可插3~5萬枝。收穫時約有1~3成的簾會損壞。一般經插簾以後一年即可採收，當時的體長約4~7公分。收穫方法依季節不同而有自地上拾起脫落者，有用蚵鉗打落簾上的蚵者，也有整支拔起運回者。（摘自今日經濟9月號）

番茄廢料可以餵羊

西班牙首都馬德里附近有一個羊的育種小組，利用番茄的廢料來飼養羊群的結果令人滿意。因此當地便有1,200公頃的農場組織起來，如同其他集約栽培的現金作物一般用來生產番茄。你以為如何？（摘譯自Centerpoint- AVRDC, Spring, 1981）

男子中年以上常有攝護腺腫大的情形。夜晚小便1~2次就是紅燈信號。本書原著者提供調節營養早期預防之道，可供醫師及一般人士參考。

請看——

南瓜子與攝護腺


J. I. Rodale原著 梁 鳴 編譯

本社與美國Rodale Press, Inc.
合約取得中文版之譯著及發行權。

定價120元

（郵購另加掛號郵資9元）

豐年社 台北市溫州街14號
郵政劃撥 5930 號



今天節目食的學問主持人：
藍梅筠老師精心鉅著兩本食譜——

中華名菜譜 西菜西點精華

是餽送親友最實用的禮物，特價優待讀者，中華名菜譜特價300元，並贈送價值40元的便當快餐食譜一本，西菜西點精華特價360元
中華出版社郵撥帳號18080號