

# 葡萄棚下

種

## 花椰菜

菜天來

葡萄休眠期

棚下種花椰菜



胡淵泉農友是彰化縣埔心鄉農會油車村葡萄研究班的班員，他利用葡萄休眠期種花椰菜，這樣非但農閒期勞力得以充分運用，且利用葡萄休眠期間，充分利用土地，提高經濟效益；另一方面可增加收入，改善農家經濟。

加強葡萄整枝

增進菜株日照

胡農友經營的葡萄園面積共計 0.4公頃。他在葡萄全部落葉進入休眠期，在棚下開始中耕施肥和整地工作，然後立即種「超晚生」種花椰菜，等到 8 月上旬，第 2 次栽種花椰菜。菜苗在定植後約 1 星期，開始生根成活。這時準備做葡萄第 3 熟的剪枝、摘葉、藥物處理等工作，使菜苗能充分接受日光照射，以促進發育、生長。

菜苗種植時不宜整地，避免傷害葡萄根羣，每 0.1 公頃僅在栽植穴內施用 1 公斤裝大葉土壤改良劑 1 包（每 1 季作），可促進花椰菜生長，改善品質。如提早做覆土工作，可避免被強風刮倒。

小心施肥澆水

注意病蟲防治

6 月上旬種植的超晚生種，行距 60 公分、株距 55 公分；8 月上旬栽植的夏賣種，行距 60 公分、株距 45 公分。

肥料施用量，第一季使用硫酸銨 320 公斤、過磷酸鈣 200 公斤、氯化鉀 100 公斤、尿素 80 公斤。第二季施用硫酸銨 220 公斤、過磷酸鈣 160 公斤、氯化鉀 100 公斤

、尿素 80 公斤，以上三要素肥料分 2 次施用，尿素在發育初期要泡水澆。

等花蕊像茶杯大時，應即折葉遮蓋花蕊，在遮蓋前，應先噴殺蟲劑防止蟲害發生。蟲害有吊絲虫、夜盜虫、青虫等，可用「速滅精乳劑」稀釋 2000 倍噴霧。病害為露菌病，用鋅錳乃浦（大生 45）400 倍噴霧。平時應注意灌水，但不宜過多，保持平均濕度。如遇高溫時，花椰菜價格必大幅下跌，所以菜園不宜灌水，以免加速花蕊生長。

4 分地收 2 季

盈利 63026 元

2 季支出項目，包括：肥料、農藥、工資及雜費（包括菜苗）共計 26,974 元，花椰菜採收 13,000 公斤，售價 90,000 元，盈利 63,026 元。

利用葡萄休眠期種植花椰菜，一些沒被花椰菜完全吸收的肥料，可供下期葡萄繼續利用，不但省肥又省工，對農家收益幫助很大。

徵文 我的成功故事

台灣各地任何農家採用新品種、新技術，或新經營方法，得到好收成、好收益，或改進生活的真實故事，1,500 字左右，附工作照片，註明農友姓名詳細住址。

歡迎各地農友投稿，農會推廣人員多訪問農家，訪問稿發表後，稿費從優，受訪問之農友，發表後贈送本刊一冊，不另付稿酬。