

於74年4月經檢驗認定不純物含量符合安全標準。

用於花生園雜草防治，包括牛筋草、莎草、野蕧、馬齒莧、芒稷、藿香薺、小葉灰藿、小指草、滿天星、香附子。每公頃每次施藥量為40公斤，播種後雜草萌芽前，將藥劑均勻撒布於土壤表面。

菸草腋芽抑制新藥—— 抑芽素（胆鹼鹽）

58%「抑芽素」（胆鹼鹽）（Choline salt of Malei-Hydrazide）溶液是日本 Hydrazine Co., Ltd 產品，由台灣庵原公司申請農藥委託田間試驗，成品農藥為淡褐色水溶性液體，廠牌名稱為億能素（C-MH）。

「抑芽素」（胆鹼鹽）是生物性鹽類的抑芽素，不含金屬鹽類為其特性，所以較具安全性。政府規定「抑芽素」成品農藥中的不純物（Hydrazin）不得超過 1 ppm，庵原公司提供此種成品農藥樣品，於74年4月經檢驗認定不純物含量符合安全標準。

用於抑制菸草腋芽，每公頃每次施藥量為 6 公升，農藥稀釋倍數為60倍。菸草摘芯後，即將藥劑均勻噴於株上部 5 ~ 6 片葉面上，每株20 c.c.，發芽前避

免施藥，以免發生藥害。限定施用 1 次。

積谷害蟲新藥——陶斯松

10%「陶斯松」烟燻劑（Chlorpyrifos）是美國陶氏化學公司（Dow Chemical Co.）產品，由惠光化學公司申請農藥委託田間試驗，成品農藥為液態烟燻劑，廠牌名稱為Dursban。

「陶斯松」殺蟲劑純品為白色粒狀結晶，熔點 41.5~43.5°C，屬於廣效性殺蟲劑，亦有供為環境衛生用藥，殺蟲作用為接觸、吸入、汽化等毒性。

用於防治積谷害蟲，空倉及袋裝稻谷每 100 立方公尺使用藥量 0.5 公升。烟燻方法為密閉烟燻 2 天，施藥 1 周後，稻谷始可出倉。



使用農藥，請注意使用
範圍、防治對象、使用方法
、採收前停止用藥日數。

台灣省政府農林廳



IRRI PUBLICATIONS 歡迎購閱！

新書

書名	頁數	價格(台幣/元)
RICE COLD TOLERANCE WORKSHOP	139	180
IRRIGATION WATER MANAGEMENT	170	200
RICE BLAST WORKSHOP	222	200
DROUGHT RESISTANCE IN CROPS WITH EMPHASIS ON RICE	414	430
ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE NEW RICE TECHNOLOGY	402	220
EVALUATING TECHNOLOGY FOR NEW FARMING SYSTEMS	110	160
RICE IMPROVEMENT IN CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES	307	220
EVOLUTION OF THE GENE ROTATION CONCEPT FOR RICE BLAST CONTROL	130	160
A FARMER'S PRIMER ON GROWING RICE	221	160
AN ADVENTURE IN APPLIED SCIENCE	233	250
MANUAL FOR TESTING INSECTICIDES ON RICE	134 (彩色照片24張)	360

台北市溫州街14號 每次郵購另收掛號郵資16元 郵政劃撥0005930-0號豐年社