

→

密前，雖可在田間發現被害葉，但在白天於稻田中絕難發現成虫存在。在此一時期，成虫於白天棲息於田埂或灌排溝茂密的雜草中，待夜間再侵入稻田產卵，黎明時又潛返雜草。因此，瘤野螟的發生常讓人有突發的感覺。

清除雜草 不可過度施肥 避免過早或太晚種植


早植稻田，因較早可提供成虫喜好的棲息環境，在水稻生育早期，常可遭受到較嚴重危害。然而另一方面，成虫喜歡在稻葉較嫩的稻田產卵，因此施肥過重，或晚植稻在普植稻成熟期，亦常受到較為慘烈的危害。了解上述成虫習性，農友可於水稻種植前盡量去除田邊雜草，避免過早或太晚種植，以及過度施肥，當可減少本虫的危害。

適時防治 可收事半功倍之效

對瘤野螟虫的防治，目前仍以施用藥劑防治為主

。農林廳出版的植物保護手冊，推薦於防治瘤野螟虫的藥劑達12種之多。這些藥劑原均經政府有關單位試驗後推薦使用，但是部分藥劑可能因農友長期使用，害蟲已產生抗性，不宜再繼續使用。

此外，防治本虫務必把握本文上面所述防治重點時期，實施防治才可獲得事半功倍的效果。然而實際上，田間虫害的發生，並非單純的只有瘤野螟虫1種，其他諸如褐飛蝨或斑飛蝨，亦常於水稻抽穗後造成嚴重危害。因此選擇1種至兩種藥劑，於水稻抽穗前作適當的防治，才是經濟治蟲之道。




CHIA NONG

佳農牌自走式噴霧車・搬運車

葡萄、柑橘、梨、楊桃、蓮霧…等果樹病蟲害自動防治機械

七年低利貸款 政府有補助



CN-2300型



CN-600SL型

優點：

- 機動靈活，不受地形限制。
- 風量特大，著藥效果特佳。
- 節省大量人力、工時、農藥費。
- 遠離藥害，維護健康安全。

歡迎經銷洽購

噴霧車・農地搬運車專業製造
佳農機械股份有限公司

地址：台中縣神岡鄉三角村大富路12-1號
電話：(045) 275285~9(5線)