

子女的婦女等，絕育是絕對需要，而結紮是最簡捷的辦法。

結紮對婦女的荷爾蒙分泌和輸送沒有影響，所以不致改變婦女的月經、性情、性機能 and 女性的一切特徵；至於一些婦女結紮之月經失調、發胖、脾氣暴躁、早期衰老……等現象，乃與年齡增加、卵巢的功能衰退，而產生一些荷爾蒙分泌不足的原因有關。

男性結紮

男性結紮比女性結紮方便，手術是從陰囊的根部，即睪丸的上方下刀，將陰囊的皮膚縱切2、3公分，就可看到手指大小的精索（中有血管、神經及輸精管）的鞘膜，打開鞘膜，從血管下方把輸精管挑出，切除四分之一吋長，將兩端結紮起來，送回本來包裹的組織中，最後縫合皮膚。

男性結紮雖是一種簡單的手術，傷口很小，手術後並不妨礙一般的日常工作，但亦避免激烈運動和勞動，以免引起陰囊血腫，延誤傷口的痊癒。手術3～5天即可拆線，拆線前傷口避免弄濕。

婦女的輸卵管結紮後馬上就有



一個孩子養的好(阿郎攝)

避孕作用，但結紮輸精管並非馬上就發生避孕效果，手術後精子雖不能由睪丸輸送到輸精管膨大部或儲精囊中，但結紮前殘留的精子仍可活數周之久，仍需用其他避孕方法，手術後，一定要做精液分析確定無精子存在後才能生效，手術後睪丸可能會有點腫脹，以局部冷敷即可消腫。

家計中心家庭計畫的宣傳詞中有一則是「家庭計畫，男士率先」是有其道理的，同時亦有醫院鼓勵體貼的先生做男性結紮比女性結紮來得方便快捷。

手術後男性荷爾蒙照常由睪丸分泌後，直接進入血液循環全身，絕不致女性化，且不影响體力；射精時仍有精液，因精液是在儲精囊和前列腺中製造而與結紮無關，只是精子因結紮不能通過輸精管而自行在睪丸吸收，對健康與夫妻生活不會有任何影響。

所以，任何一個個性、心理成熟、情緒穩定且不希望再生育的男士，均可接受男性結紮。但結紮是永久的避孕法，不管是男、女方做結紮手術，必須經雙方的認可，以免發生誤會和麻煩。



MELOBAC® 效果“一級棒”！

爛根、敗壞的救星！



研究班班長請注意！

因應農業政策
降低生產成本
提高品質產量

メロバック 水性微生物

特級**農神**-M

(磷·鉀·鎂吸收促進劑)

神農行

農友信箱台中郵政2374號

電話：(04)2528288

本公司指導您如何生產微生物肥料
提供您技術配方，造福班員！

條件：(1)限研究班班長
(2)請出具農會證明
(3)廠商恕不受理
(4)一律通信洽詢

審定商標第00361933號

歡迎研究班來函索取目錄及微生物技術指導手冊