

。各次施肥時，最好在雨後田間濕潤時，以點施或條施，施於植株列間。地力較差的土地，植株發育不佳時，於5月上旬至中旬，每公頃再施用150~200公斤硫酸銨作為追肥時，促進發育，增加產量。追肥採用點施於植株行間，避免肥料接觸葉部，發生肥傷。

## 田間管理

1.補植：發芽後1~2星期內，遇有缺株時進行補植。

2.中耕除草：植後如氣候溫暖，兩星期後即行萌芽，幼芽逐漸露出地表，1個月後株高達30~40公分時，視田間雜草發生情形，用除草機或鋤頭除去，除草時應注意勿損傷初出土面的幼芽。用43%拉草乳劑，每公頃施用3,000~4,000C.C.，稀釋250~300倍，於種植後萌芽前均勻噴佈於田間土面，有防止雜草發生之效，以後地下部陸續長出新芽，並快速生長繁茂，田間雜草即受抑制。

3.灌溉排水：食用美人蕉不耐旱，又忌水浸，如遇久旱不雨，田間過於乾旱時，須適宜灌溉，降雨後則要注意田間排水。

## 收穫・調製及製粉

在1年四季不明顯的熱帶地區，食用美人蕉屬多年性作物，地下部根莖連續分球不斷。在本省或亞熱帶地區，冬天氣溫下降，則有休眠習性，自11月起，地上部植株及葉片隨溫度下降，逐漸枯萎落葉，一般利用此一休眠期為收穫適期，此時正是地下部根莖澱粉蓄量最高時期，至3月後春暖時，地下部根莖長出新芽，並繼續恢復營養生長，導致根莖澱粉隨生長漸次遞減。收穫時用鋤頭掘出根莖邊緣及周圍表土，注意勿傷及根莖，小心挖出根莖，去除夾雜物、鬚根及泥土，裝入竹籠或裝袋運至製粉廠加工精製澱粉。製粉率，視栽培密度、收穫時期、品種及根莖分球等而異，一般製粉率為15~20%左右。

最經濟  
效果超群之寶物

獨創水溶液濃度  
吸收力強  
抑制病蟲害

防除霜寒旱害・預防水傷曰傷・儲積養分水分



姊妹品：綠化能・果農王・美樂農・固綠源・界王  
姊妹品：クリン・キングクリン・ミノル・ダーク・グリーン・カス

## 固着性・撥水性優異之鱗型液臘

### ●特性：

- ①愛美旺之主成分含有天然臘、避蟲劑、乳化劑等，對人畜毒性、魚毒性全無之製品。
- ②植物本體含有臘質，本製品之乳化劑係使用脂肪酸對植物全無弊害。
- ③愛美旺係經特殊反應處理製成之鱗型液臘，使用濃度之厚薄均不影響植物生長，保護植物健壯，提高嫁接成活率。
- ④增強藥性，延長藥效，預防細菌侵入及蟲害發生，增強抗病能力，保護莖葉果粒，增加果實亮麗。



皇國貿易有限公司

台中市大雅路473號

經銷處：全省各農藥行及服務站