

另外，在冬季網室內觀察這兩種葡萄介殼虫發育狀況，結果顯示其在冬季生長雖緩慢，但仍可生長發育。

成虫體包腊質且藏身果穗內 藥劑不易噴到

在彰化縣溪湖鎮巨峰葡萄園選定試區，以不同殺虫劑試驗防治爲害巨峰葡萄的桔粉介殼虫。由田間試驗結果顯示，施藥區與未施藥區有顯著的差異，而各種殺虫劑之間亦有差異，但從葡萄輸出檢疫的立場來看，尚無法達到完全防除，檢討其原因是桔粉介殼虫成虫體表包被有腊質，且成虫多隱藏在果穗內，一般殺虫劑不易接觸，所以防治效果不能達到 100%，若能針對桔粉介殼虫若虫發生時期來防治，則可獲得優良的防治效果。

冬季應先清除虫源 然後再密集防治若虫

在彰化縣二林鎮釀酒（金香）品種選定試區，



釀酒葡萄——黑后品系

以不同殺虫劑試驗防治棕櫚盾介殼虫。結果顯示，施藥區與未施藥區，具有極顯著差異，且這些試用殺虫劑的防治效果皆較好，檢討其原因，這些殺虫劑具有長殘效性，除對成虫具有防治效果外，對若虫亦具有防治效果。

76年冬季在二林金香葡萄試區，配合一般葡萄園栽培技術，先行清除葡萄園介殼虫越冬的虫源，然後分別以40%「滅大松」（Supracide）稀釋800倍及44%「大滅松」（Dimethoate）稀釋1,000倍，每隔兩週施藥1次，連續施用3次，在



日本三共株式會社榮譽出品

日本原裝進口
登記證：農藥進字第0432號
台北農藥廣告字第76100號

立枯靈30%液劑

（殺紋寧）

立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、使用方便。

* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 *

徹底消滅土壤病菌
培育健苗必備良藥

總經銷 實昌貿易股份有限公司
台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414・7050155

台灣總代理



中國化學製藥股份有限公司
CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台北市襄陽路23號 電話：3816740