

(※為兼顧安全用藥，並提高烏龍茶之獨特香味，夏季應減少施藥次數)

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	注意事項
5%合芬寧膠囊懸著液 (Alphamethrin)	1 公升	1,000	1.採收前 15 天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 3.對蜜蜂劇毒。
20%亞滅培水溶性粉劑 (Acetamiprid)	0.25 公斤	4000	1.採收前 12 天停止施藥。 2.具中度呼吸急毒性。
11.78%布芬第滅寧乳劑 (Buprofezin 十 Deltamethrin)	1 公升	1,000	1.採收前 15 天停止施藥。 2.對水生物具毒性。
40%加保福化利可濕性粉劑 (Carbaryl 十 tau - Fiuvalinate)	0.5 公斤	2,000	1.採收前 21 天停止施藥。 2.對水生物具毒性。
30%撲芬松乳劑 (Fenvalerate 十 Fenitrothion)	1 公升	1,000	1.採收前 21 天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
5%賽扶寧水基乳劑 (Cyfluthrin)	0.5 公升	2,000	採收前 18 天停止施藥。
9.6%益達氨(Imidacloprid)	0.35 公升	3,000	採收前 12 天停止施藥。
50%培丹可溶性粉劑(Cartap)	1 公斤	1,000	1.採收前 6 天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高。
2.8% 畢 芬 寧 乳 劑 (Bifenthrin)	0.5 公升	2,000	1.採收前 15 天停止施藥。 2.對水生物具毒性及對蜜蜂毒性高。
3%亞滅寧水基乳劑 (Alphacyperthrin)	1 公升	1,000	採收前 18 天停止施藥。
3%亞滅寧乳劑 (Alphacyperthrin)	1 公升	1,000	採收前 18 天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑 (Cyhalothrin)	1 公升	1,000	採收前 10 天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液 (Cyhalothrin)	1 公升	1,000	採收前 10 天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (Cyhalothrin)	1 公升	1,000	採收前 10 天停止施藥。
10%芬普寧乳劑 (Fenpropathrin)	0.5 公升	2,000	採收前 6 天停止施藥。

5%護賽寧乳劑 (Flucythrinate)	0.625 公升	1,600	採收前 10 天停止施藥。
50%加保利可濕性粉劑 (Carbaryl)	1.25 公斤	800	採收前 21 天停止施藥。
24%納乃得液劑 (Methomyl)	1.4 公升	700	採收前 21 天停止施藥。
40.64%加保扶水懸劑 (Carbofuran)	1.25 公斤	800	採收前 21 天停止施藥。
10%美文松乳劑(Mevinphos)	1.5 公升	650~750	採收前 7 天停止施藥。
10%美文松溶液(Mevinphos)	1.5 公升	650~750	採收前 7 天停止施藥。

(二)低容量撒佈：

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	注 意 事 項
40%加保利水懸劑 (Carbaryl)	2 公升	6	1. 使用共立動力微粒噴霧機，加 裝早苗牌低 容量噴霧裝置，使 用 3 號噴嘴(600 迴轉數以 上)噴數次。 2. 在無風及微風時施藥茶樹採摘 面應力求 整齊(水平)。 3. 施藥時人行方向與風應成直角，必需順風 向噴射，噴槍保持 略向上場其有效射程約為 5~ 6公尺在噴射時行走速度每分 鐘 25~35 公尺。 4. 採收前 21 天停止施藥。