



七、環境傷害篇



圖1. 殺草劑年年春危害使枝條變細、花變畸形。



圖2. 設施內太熱造成花萼片焦枯。



圖3. 設施內太熱花瓣數變少。



圖4. 設施內太熱、營養出現問題，造成花朵變小。




圖5. 施用殺草劑後之噴藥器具或管路要清洗乾淨，最好有殺草劑專用之噴藥桶。



圖6. 設施內太熱新芽枯焦、萎縮。

環境傷害篇



圖7. 設施內太熱葉片葉緣枯黃。



圖8. 颱風傷害切花(金色勳章品種)。



圖9. 颱風傷害葉片(第一紅品種)。



圖10. 溫度太低，零下3℃造成枝條凍傷。



圖11. 颱風後造成淹水應迅速排除積水、清除落葉、噴施藥劑、整理設施。



圖12. 淹水後之植株須清洗葉片上之污泥。

玫瑰栽培研究彩色圖說



環境傷害篇



圖13. 落葉可能係因環境急劇變化所造成。
例如太乾、太濕、溫度變化大。



圖14. 光照不足造成盲芽。



圖15. 環境急劇變化，溫差過大易發生逆境現象。



圖16. 在設施內可減少黑點病之發生。




圖17. 缺水造成新芽發育不良。



圖18. 以風扇、遮陰、捲陽器、太子樓、塑膠布密封、加溫機等方式調整設施微氣候以確保花卉品質。