

台灣地狹人稠，可耕地日益減少，又處病虫害容易孳長的地區，因此既安全又有效的使用農藥已是農作物生產的首要條件，近年來政府與社會大眾對維護身體健康，提高生活品質極為重視，故正確使用農藥的重要性更加顯著，吾等農民如何正確地使用農藥來種植出高品質的作物，又能兼顧消費者的健康及我們賴以生存的大地不被污染破壞，是我們今後最須努力遵行的目標。

正確診斷，施藥適當， 請消費者安心

燕巢鄉農會／黃金城

我是核心農民，從事農業已有20多年，耕作面積有0.8公頃，種植的棗子、拔仔是我們鄉裡的特產，今天我所要說的正確診斷、施藥適當、請消費者安心，是棗子的使用農藥經驗談，來和大家前輩、先進做研究。我的經驗是按呢（這樣），因為棗子每年3~4月間必須整棵鋸掉，使它重新發芽，此時開始噴佈好年冬精500~1000倍液於地面60公分以下頭部，預防白斑黑天牛的幼虫蛀食、成虫產卵。

4~7月間開始發芽準備開花結果，當芽要發出時就要噴乙次對付粉介殼虫和毒蛾的農藥，預防芽長出來被刺毛虫和白龜神為害吃掉，我的防治是用陶斯松可濕性粉劑2000倍和滅大松乳劑1000倍，每15天噴1次，至8月以後開始開花結果時，以上藥劑加可濕性硫磺粉劑500倍使用，預防白粉病產生，如果發現白粉病時每週噴乙次，至10月以後就要預防大頭病（缺硼症），以上藥劑加農用硼（硼砂溶液）400倍共用，使用兩次即可。

如我們本鄉所種之棗子正確診斷出病菌以及虫害，能對症下藥，施藥適當不過量、不殘留，至11~2月中間採收前期，必須噴藥的情形下盡量選擇短毒性或低毒性的農藥使用。

各位農友先進，咱果農只要診斷正確、用藥適當，自然而然用藥量很少，就能達到很好的效果，節省了時間和金錢，而且咱的果樹也能很茂盛，果粒品質受到社會上消費者的喜愛。

現在政府推廣網式栽培，因成本高，政府補助有限而未能普遍，農友無法享之，全省有網式設施者才700公頃左右，目地就是要農友盡量減少農藥使用量，因為我國農藥使用量為世界各國中最高的之一。

我的結論是，現在的社會以及我們的政府實施精緻農業，求質不求量的情形下必須要有正確的診斷、適當的用藥，農友前輩共同遵守道德，採收前決不施藥，才能請消費者安心。