

萬丹的白玉苦瓜



棉絮覆蓋果實。

或許是苦味較以往清淡的關係，近年來，苦瓜越來越受消費者的喜愛了。影響所及，苦瓜的栽培面積也有愈來愈多的趨勢。根據台灣農業年報資料，民國82年台灣地區苦瓜栽培面積2,242公頃，其中高屏地區擁有1,184公頃，占全部苦瓜面積的53%。

苦瓜栽培面積最多的地方

可知道高屏地區苦瓜最大的產地在那裡嗎？萬丹鄉。該鄉苦瓜面積一年約有200公頃，均勻分散在水田及高屏溪的河川地。


萬丹鄉苦瓜栽培已有數10年的歷史，生產形態很傳統，一如農友早出晚歸的工作習性，10幾20年來幾乎沒有什麼變化；

種植時間在每年9月和10月；栽植方式清一色匍匐地面；即使所用的資材也相當古董，例如畦面敷蓋的稻草、幼果覆蓋用的棉絮。就是栽培技術也未有大幅的改進。


惟獨品種，變化不小，而且是附近鄉鎮的先趨。近5年來，該鄉苦瓜流行「黑仔」品種，所謂「黑仔」，即種皮黑色的品種，目前已傳播到屏東縣其他鄉鎮。事實上，經個人深入探訪瓜農的結果，發現黑仔品種係自中部引進的。因為它果型大、米粒粗，很快的風行萬丹，乃至屏東。

秋冬季是栽苦瓜的旺季

由於秋冬季是高屏地區的旱季，不怕田間積水，因此，該鄉的水田苦瓜栽培一般採用寬行，即8公尺寬畦，每畦種2行，



大竹簍裝已較少見了。



◀ 秋冬盛行利用高屏溪河床栽培苦瓜。

河川地的和水田的大同小異，倒是砂子凝聚力差，溝灌不易，所以河川地苦瓜以塑膠軟管灌溉為主。

根據台中區農改場方敏男先生的試驗，苦瓜幼果長2~3公分時套袋，瓜實蠅被害率為零；如果完全不套袋，被害率達99%。因此一方面防止瓜實蠅危害，一方面使苦瓜雪白美觀，該鄉瓜農通常在幼果3~4公分長時覆蓋棉絮，有時一次不只蓋一條苦瓜，瓜農把這種動作戲稱蓋棉被。大體說來，棉絮可重複利用2年，成本比塑膠袋便宜些。

採收靠經驗，十不離九

採收作業是苦瓜栽培的重頭戲，為趕赴九如果菜市場拍賣，農友習慣透早摸黑上路，頭頂燈光下田採撷，下午再回瓜園包棉絮及其他管理工作，真是「粒粒」皆辛苦。

也許有人要問，收成時棉絮一個個掀開看豈不費時費工？水仙村李姓瓜農表示：不會。他指出，經驗多了根本不需要一個一個掀，只要看棉絮鼓起的程度，或巧手一摸，就知道可不可以挽，通常八、九不離十。

萬丹鄉的苦瓜從初秋種植，一直採收到第2年的2、3月間，氣溫回升的時候結束產期，然後趕種一期水稻。瓜農也都知道，不種水稻逕種苦瓜並不好。如此周而復始，蘊育萬丹苦瓜蓬勃的生機。