

百合欣賞

曾文田 攝自花蓮區農業改良場



葵百合 有特殊香氣 品種較少

百合栽培 1 · 2 · 3

切 花用百合種球，目前大多自荷蘭進口，種球在荷蘭產地運來前，已先經過低溫前處理，因此，在栽培上必須注

意取到種球時，要馬上定植田間，不可置於高溫下過久，否則將引起不良反應，如生育不佳、落蕾、盲芽等現象。
花蓮區農業改良場特提供切

花百合的栽培要點，簡述如下。
(1)土壤：宜選擇土質疏鬆，通氣性及排水性良好之土壤，土壤pH值為微酸性或近中性。
(2)肥料：多施用有機質肥料



鐵砲百合 白色為主 內銷不多



防雨棚設施栽培

姬百合 色彩最豐富 花朵小花數多

(如堆肥)，每10公畝化學肥料硫酸銨90公斤，過磷酸石灰100公斤，氯化鉀30公斤，三分之二宜作基肥，剩餘三分之一當追肥。

(3)行株距：鱗莖種植深度為

其厚度2至3倍，行株距約15×25公分，視種球大小，可適度調整栽植株距。

定植萌芽後，宜施系統性殺菌劑，如億力、阿特菌等；為提

高切花品質，宜採用防雨棚設施栽培。百合栽培不適宜連作，並注意蚜虫、薊馬的防治，以免感染毒素病。至百合最低處之第一朵花顯色後，即為採收適期。■