

## 梅-蟲害

病害名稱	藥劑名稱	稀釋倍數	注意事項
桑擬輪盾介殼蟲	40%丁基加保扶可濕性粉劑 (Carbosulfan)	1200	採收前 9 天停止施藥
毒蛾類	2.5%賽洛寧微乳劑* (lambdacyhalothrin)	1000	採收前 6 天停止施藥
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambdacyhalothrin)	1000	採收前 6 天停止施藥
	2.8%賽洛寧乳劑* (lambdacyhalothrin)	1000	採收前 6 天停止施藥
蚜蟲類	10%氟尼胺水分散性粒劑* (Flonicamid)	3000	採收前 6 天停止施藥
	9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid)	3000	採收前 9 天停止施藥

	2.5%賽洛寧微乳劑*(lambda-Cyhalothrin)	2000	採收前 6 天停止施藥
	2.46%賽洛寧膠囊懸著液*(lambda-Cyhalothrin)	2000	採收前 6 天停止施藥
	2.8%賽洛寧乳劑*(lambda-Cyhalothrin)	2000	採收前 6 天停止施藥
	40.8%陶斯松乳劑*(Chlorpyrifos)	2000	採收前 18 天停止施藥
	40.8%陶斯松水基乳劑*(Chlorpyrifos)	2000	採收前 18 天停止施藥
	30%裕必松可濕性粉劑*(Phosalone)	1000	採收前 18 天停止施藥
葉蟣類	15%亞醜蠅水懸劑*(Acequinocyl)	1500	採收前 6 天停止施藥
	1%密滅汀乳劑*(Milbemectin)	1500	採收前 6 天停止施藥

	10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	2000	採收前 15 天停止施藥
	18.3%芬殺蟻水懸劑* (Fenazaquin)	3000	採收前 9 天停止施藥
	50%芬佈賜可濕性粉劑* (Fenbutatinoxide)	1500	採收前 10 天停止施藥
薊馬類	10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	1500	採收前 15 天停止施藥