

工作人員職業健康及安全管理

1. 豬場中可能影響或危害人員安全及健康之因素

- (1) 豬隻攻擊咬傷。
- (2) 消毒水原液稀釋時噴濺到眼臉。
- (3) 蒸器高壓滅菌鍋操作不當，引起之燙傷。
- (4) 治療或免疫豬隻時，被針頭扎傷。
- (5) 感染人畜共通傳染病。
- (6) 蛇類、蜘蛛咬傷。
- (7) 吊運重物受傷。

2. 危害因素之預防措施

(1) 預防豬隻攻擊咬傷意外：

- (a) 改善分娩舍欄位之母豬架，將隔離空隙改小，避免人員於免疫注射作業，抓小豬時，不小心被護子心切之母豬咬傷。
- (b) 淘汰神經質攻擊性強之豬隻。
- (c) 從事於豬接觸的工作（如注射、固定、閹割）時應使用擋豬板、套索或設備（隔離欄）等保護身體，不可過於自信大意，切勿單獨作業。

(2) 預防消毒水原液稀釋時噴濺到眼臉：

- (a) 消毒水原液稀釋作業時應戴護目鏡、口罩及手套。
- (b) 傾倒消毒水原液入水中時，稍微偏轉頭不要直視，人走開後再啟動打氣馬達攪合，稀釋，避免噴濺到嘴臉。

(3) 預防蒸氣高壓滅菌鍋操作不當，引起之燙傷：

- (a) 初學操作者應由熟練人員陪同示範操作，至熟練人員認可可單獨操作止。
- (b) 注意蒸器高壓滅菌鍋結構是否有異常，最常發現之異常有漏電、氣閥鬆脫損害、門栓塑膠套緊老化咬合不緊。有關高壓滅菌鍋之操作程序、保養程序及注意事項請參考相關之設備維護保養標準作業程序書
- (c) 忘記鍋內加水或水量不足。
- (d) 滅菌鍋起壓後，發現鍋內無水，馬上降壓打開鍋蓋加水，因鍋內物品尚有餘壓，接觸到冷水會爆開，炸傷人員。

(4) 預防治療或免疫豬隻時，被針頭扎傷：

- (a) 注射人員不要太心急，應等助手將豬隻完全固定好後再注射，避免豬隻晃動扎傷自己，也可讓注射部位更準確。

(5) 預防感染人畜共通傳染病：

- (a)經由病原監控，清除病原或淘汰病豬。
- (b)與豬接觸之各項工作，人員應自我警覺，養成良好之衛生習慣，淋浴，勤於洗手消毒，現場工作時不吃零食、檳榔、抽煙、抹嘴、咬指頭。
- (c)每年至少一次安排人員接受例行性職業健康檢查。
- (d)每年一次定期接受流行性感疫苗注射及每10年1次接受破傷風疫苗注射。

(6)預防蛇類、蜘蛛咬傷：

- (a)定期清理，保持場區棟舍內外環境整潔、修剪綠籬，清除藤蔓及雜草、水溝保持通暢，無廚餘、飼料粒、胎衣、垃圾、堆積物狀態。
- (b)週三為全國消毒日，勵行消毒，消毒水氣味、水漬可阻擋生物侵入。
- (c)侵入之生物經驅趕或捕捉帶離後，其經過之路徑區域應於以加強消毒。
- (d)穿雨鞋前，先倒翻敲敲，再看看，避免蟲蛇躲在鞋內。

(7)預防吊運重物受傷：

- (a)吊運設備應定期保養，更換束帶零件。
- (b)使用前應先試車，確認吊載正確。
- (c)操作中如有異常狀況，應立即停車，聯絡承攬技師維修。
- (d)操作人員應著安全帽、鞋，操作時應專注，應有助手支援、警戒。

4.危害應變程序及應注意事項

- (1)當人員遭受豬隻獠傷、咬傷、尖銳器物割傷時，同事應儘快利用醫療藥品（置放於員工休息室）將傷口消毒後，立即以電話通報主辦人或主管，如傷勢嚴重應立即送醫。
- (2)消毒水原液噴濺到眼臉，應用大量清水沖洗眼睛，並盡快送醫；若不小心食入，立即送醫。
- (3)人員如被蟲蛇咬傷應立即送醫，同事應幫忙認清蛇的形狀、顏色及其他可能的特徵，如可能，拍照佐證。
- (4)人員如傷到腦部，應打119，呼叫救護車，由專業醫護人員急救處理。
- (5)人員如有發燒，類似感冒症狀，就醫時應向醫師表明自己之職業（在豬場工作），供醫師診斷參考。