

金柑病蟲害防治曆

月份	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
生育時期	春梢萌發及花芽分化期			花期、幼果期及果實肥大期			中大果期			果實轉色及果實採收期		
清園作業	採收結束修剪時，剪除病蟲危害枝葉、密生枝、黃葉枯枝，並全面清除果園雜草、落葉、落果、枯枝、爛果和殘果											
介殼蟲	 <p>全年發生，確實清園，剪除有蟲枝條、不必要的新梢及太過茂密的枝葉，採收結束後及春夏芽萌發前防治要徹底</p>											
蚜蟲	 <p>確實清園，於春夏芽萌發時施藥防治，並懸掛黃色黏紙，降低果園內蟲口密度</p>											
潛葉蛾	 <p>剪除不必要之幼嫩枝梢或徒長枝，春夏芽萌發時注意防治，在發生初期防治效果最大</p>											
薊馬	 <p>春梢開花、著小果前，要特別注意薊馬之防治，可放置黃、藍色黏紙誘殺監測</p>											
天牛	 <p>應提早處理，減少其危害發生，5月份開始為天牛產卵期，為防治之關鍵期</p>											
葉蟻	 <p>確實清園，於春夏芽萌發時開始防治，發現葉蟻密度達每葉5隻時開始防治，藥劑宜輪流使用，避免產生抗藥性</p>											
銹蟎	 <p>連續高溫乾旱利於銹蟎生長，春芽萌發後若遇連續高溫時注意開始防治，乾旱季節發生特別嚴重，夏季雨水有無為其是否猖獗為害之關鍵</p>											
東方果實蠅	 <p>確實配合區域共同防治，全年懸掛含毒甲基丁香油或蛋白質水解物誘蟲器與黏紙，8月正值不同夏季水果之採收期，需特別注意東方果實蠅防治</p>											
疫病	 <p>妥善管理果園，割草時或噴殺草劑時，注意勿傷到樹幹基部；颱風或連續降雨過後易發生，故在雨季來臨前、雨後或降雨空檔時施用亞磷酸預防</p>											
瘡痂病	 <p>勿施過量氮肥，於花苞將開放時及結小果時注意防治</p>											
黑點病	 <p>注意果園衛生，剪除病枯枝，修剪整枝，使植株通風良好，日照充足，4-6月梅雨季前後為防治關鍵期</p>											
潰瘍病	 <p>剪除發病枝葉，清除雜草，並將罹病枝葉燒毀，颱風過後會加劇發生</p>											

■發生盛期；▲防治關鍵期