


豉豆

近年來本省養豬事業很發達，但對於飼養管理方法大都墨守舊規，不事改良爲一缺憾，此足以影響豬隻健康與農村經濟。因此合理飼育爲目前本省養豬事業重要課題之一。本文合理的養豬法一係討論養豬問題，足爲農民改善飼育方法促進生產之一淺顯重要提示。

以實例來說，假定每年能够賣出六頭每頭一百公斤的豬，那麼，每年的收入約略等於一萬公斤糧的價格。此外，養豬還可得到副產物的堆肥，其利益及效果很大。例如每年一甲田三年間



收	成豬賣出所得額	三、六〇〇元(每頭一〇〇元)
	堆肥估價額	一、五六三元二角
計		五、一六三元二角

離乳後期間	體 重	大豆粕	生甘藷	甘藷蔓	米	糠	鹽骨粉
一—二個月	一〇—二〇 公斤	〇三〇 公斤	二五 公斤	一五 公斤	〇二五 公斤	〇一〇 公斤	〇一〇 公斤
二—三個月	二〇—三二	〇五〇	四〇	二〇	〇五〇	〇一〇	〇一五
三—四個月	三二—四五	〇八〇	五五	二五	〇六〇	〇一五	〇二〇
四—五個月	四五—六〇	〇七五	六〇	三〇	〇七〇	〇二〇	〇二五
五—六個月	六〇—八〇	〇六五	六〇	三〇	〇八〇	〇二〇	〇三〇
六個月	八〇—一〇〇	〇六五	六〇	三〇	〇八〇	〇二〇	〇三〇

備註：鹽骨粉配合比率
 號：一〇 骨粉：三

二、收支對照表

收而會排泄體外的。
假定於一年內以出賣爲目的飼育六頭猪，那麼，究竟需要多少費用？或有多少利益？這就需要多少費用而言，他們因能够自給自足飼育猪，所以除得到出賣的猪六頭外，並且田園也能够施用堆肥，這正是一舉兩得。飼育飼料配合表及收支對照表，請參看左表。

依照左表，我們可以知道猪六頭


頭每日飼給量

的賣出價格，只得三、六〇〇元而已。但若把副產物的堆肥計算在內時，則其利益是很大的。過去本省農民都忽略了這貴重的堆肥利用價值，今後應該特別注意這一點。但在都市飼養豬的時候，並沒有堆肥的利用價值，所以收入額僅僅是三、六〇〇元，而純利益也只是八四元而已。

法賣出。可是在大家競賣的情形下，價錢不免要吃虧，假使能够多貯藏一個時期，待市面價錢好一點的時候再出售，對於農家不是更有利嗎？

這裡介紹貯藏甘薯的七個要點，以供大家參攷：

一 貯藏倉舍須消毒乾淨 甘薯



寒凍，如氣候降至華氏表五十度以下，甘薯則容易凍傷。最好當薯葉開始轉黃的時候，甘薯則可收成。掘取甘薯應儘可能選擇土地乾燥氣候溫和的日子。

三、收成的時候應極力避免使甘薯受到任何創傷。甘薯表皮很薄，容易破裂。因此採掘、收取、置放、收倉的時候，要極力避免碰撞損傷。甘薯的表皮正和人體的皮膚一樣，若保持完好，可以防止細菌侵入內部造成病害。採掘甘薯的時候，最好採用面積寬大的犁具，深深插入土中，從甘薯下面托起，這樣可以避免傷及薯體。甘薯掘出後，切莫扔丟，因為這樣也會使它受傷呢。

四、受傷或有爛點的甘薯切勿收倉。甘薯掘起後如有泥土附着，可以讓它在陽光下曬一兩個鐘頭，等乾了以後才收起。不過夏天陽光太厲害，甘薯是經不起灼熱的陽光曬的。所以在熱天的時候，甘薯收起的尚未入倉以前，上面最好用薯藤掩蓋完密，以免被陽光灼傷。甘薯碰傷或有爛點是難免的事。收倉以前須仔細檢視，若發現有毛病就趕快分開另放，不可跟好的混在一起。

放進倉舍以前，倉內所有殘留或已腐爛的甘藷同其他垃圾，必須完全清除，地上打掃乾淨，然後倉內全部施行消毒。消毒的時候可用硫酸銅藥水（比例爲廿五加侖清水放進一磅硫酸銅粉），遍灑倉內牆壁地上各部，如果買不到硫酸銅粉，用石灰水亦可。所有盛放過甘藷的箱具也要灑過。

二、甘藷應在霜降以前收成以免

七、保藏時期的溫度要降低。時期空氣濕度仍保持百分之八十五，溫度則減至華氏五十五度左右，通氣洞的啓閉可以調節溫度和濕度，譬如倉內溫度過高，那晚上下以把氣窗打開，如天氣太冷，則證明窗應緊閉。倉內水氣凝結，則證明濕度過高，應打開門窗讓空氣流通，可以降低濕度。若室外天氣乾燥又快，降一點爐火可以使倉內乾燥得快。

以上各點如能儘量做到，相信農胞每年甘薯貯藏時的損失，可以減至最低限度。

八月是黃麻的採種期。黃麻開花後過五十天即可完熟。採種時，應在全園場中選擇具有品種特徵生育良好而且分枝較少的母本，切去頭部，充分乾燥之，以棒類或槌枷等輕輕打擊之，使種子自蒴中分離而調製之，施以短期間之日曬後，貯藏于冷涼之地，若能密閉貯藏更為妥當。

黃麻品種中時而混有早期分枝的系統。此種系統產種雖多，纖維却短，收量亦少。若與之一同採種，則將繁殖許多不良系統的種子。徒

最好保持華氏表八十五度，空氣溫度保持百分之八十五。若溫度低一點，風乾的時間便要作比例上的延長。倉房房頂及牆腳應設置若干可以啓閉的氣窗，這樣可以便利倉內空氣溫度和濕度的調節。普通在風乾階段，除非溫度或濕度過高，是不大需要大量空氣流通的。

六 風乾時期保持適中的溫度和濕度 甘薯入倉後，尚須經過一般風乾時期（約十天），甘薯經過風乾後，受傷部分下面細胞，能自然形成一種堅韌的組織層，幫助防止細菌的侵入，所以風乾是有助於保藏的。風乾時的溫度，

入倉。這一點非常重要。

五、甘薯收倉後應堆放妥善。甘薯入倉後，最好分裝在空氣流通的條板箱內。假使不容易製備這樣的箱子，那麼，只好分裝在普通的容器裡。地上要用木條高高墊起，好讓下面空氣流通。堆放不要太高，太高了，一方面拿動不方便，一方面上邊的空氣溫度較高，放在上層的甘薯容易抽芽，同時要注意不要讓下邊的甘薯受潮。

然希望大量採種而不注意採種方法，二三年後該項品種即將變為早期分枝的不良品種。此乃黃麻採種上不可忽略之重要事項。

雖然同在完熟期的蒴果，其在莖之上部與莖之下部者，熟期多屬不同，時而可有四十分之左右的未熟果，故應特別精選去掉未熟之果。

耕地的生產力。至於氮化鈣所含氮素的肥效，在以往十幾年的試驗比較和田間施用，如果施用得合理，是要勝過硫酸銨。但如果對於氮化鈣的施用方法不當的時候，恐對人體或農作物有毒害。事實上，氮化鈣的施用法，就可以完全避免它的有害作用，而且可以用完發揮它的肥效。

不要一經施用前操作者不可以飲酒，不用時用濕的手來擦手，以免氮化鈣粉沾到衣服上。立即洗淨腳，手，面部等裸露的皮肤。

二、氮化鈣的用量，每公頃需一五〇—三〇〇斤（即每市畝二五〇—四〇〇市斤）；可以油餅或人糞尿等相互換用。每斤氮化鈣約合油餅三斤至五斤。人糞尿一斤約合一〇斤乾糞。一〇—一五斤，但是不可以完全代替農家肥料，換言之，農家肥料須盡量應用。

三、氮化鈣原則上最好是用作基肥，可用於甘藷、四、氧氣化鈣必須先與細土混合後立施，不宜與硫酸銨或過磷酸鈣混用。要對水行之，先在整地之前再行排水。

圖中展示了兩種包裝形式的氮化鈣肥料。左側是一個較大的袋子，標有“CaCN₂ 肥料”和重量“150-300kg”，下方註明適用於“一畝”。右側是一個較小的袋子，同樣標有“CaCN₂ 肥料”和重量“20-40kg”，下方註明適用於“一畝”。

