


怎樣防治小白菜的黃條葉蚤

省農業試驗所技正 陶家駒

(一)黃條葉蚤是小白菜上最嚴重的害蟲。本省南部春季和夏季，在小白菜上，黃條葉蚤的發生，多集中在五月至六月間。黃條葉蚤的發生，多集中在五月至六月間。黃條葉蚤的發生，多集中在五月至六月間。

(二)黃條葉蚤的防治方法。黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。



黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。



黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。

黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。

黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。黃條葉蚤的防治方法，應以预防为主。在小白菜生長初期，應注意觀察，發現黃條葉蚤的蹤跡，應立即採取防治措施。

柑橘施肥方法

授教院學農立省盛澄

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

要素	第一次(春肥)	第二次(夏肥)	第三次(秋肥)
氮素(N)	1000	1000	1000
磷素(P)	500	500	500
鉀素(K)	1000	1000	1000
鈣素(Ca)	500	500	500
鐵素(Fe)	500	500	500
錳素(Mn)	500	500	500
鋅素(Zn)	500	500	500
銅素(Cu)	500	500	500
硼素(B)	500	500	500
氯素(Cl)	500	500	500

要素	第一次(春肥)	第二次(夏肥)	第三次(秋肥)
氮素(N)	1000	1000	1000
磷素(P)	500	500	500
鉀素(K)	1000	1000	1000
鈣素(Ca)	500	500	500
鐵素(Fe)	500	500	500
錳素(Mn)	500	500	500
鋅素(Zn)	500	500	500
銅素(Cu)	500	500	500
硼素(B)	500	500	500
氯素(Cl)	500	500	500

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。

柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。柑橘施肥方法，應根據柑橘的生育期、土壤肥力、氣候條件等因素，制定合理的施肥方案。