

本省養豬比較容易發生的傳染病有豬瘟、豬丹毒、豬肺疫和豬副傷寒等。關於這幾種傳染病，常有各地農友寫信來詢問病症的現象和防治方法。列在後面的一個簡表，也許能給農友們一些參考。但農友們注意，發現你們養殖的豬發生病症時，還是要立刻就近請獸醫來診視，才是最妥當的辦法。

病染傳通普種幾的豬

群玄黃

病名	病原	症狀	解剖檢查	預防及治療
豬瘟	病溫過性	不分不食易易其急走，後不能起立。精食水飲食定型症狀基急性的常	大紫便斑，耳膜下眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，腹部下面有鮮	體表——有紅紫斑。見有割去腫脹皮充出膿血
豬丹毒	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血
豬肺疫	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血
豬副傷寒	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血
桿菌B炎	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血
沙型菌	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血
屬氏	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血
屬陽	病溫過性	精神不穩，但飲水不下垂，後來不能起立。後細麻疹，精食水飲食定型症狀基急性的常	上眼瞼角膜充血，眼瞼瞼膜充血，眼瞼瞼膜充血，被毛無光澤，鼻端，頭部下面有鮮	肝脾腫。見有割去腫脹皮充出膿血

各地洋蔥現在將要大量收穫，如果處理不當，在運銷或貯藏中就容易發生腐敗（最普遍的是頂腐病），以致遭受損失。現在把收穫包裝和貯藏要點，分述如下：

洋蔥的收穫和貯藏

吳國璋

(一) 收穫：在蔥葉部開始倒伏時收穫（普通以三成以上植株葉部倒伏時才開始收穫），收穫時須選晴天，拔起植株，排列田間，以葉部覆蓋球部，整齊排列。經二、三日葉部曬乾後，把蔥球葉部結成一束一束，懸掛於簷下或屋內通風地點風乾，風乾時間約二星期。蔥球頸部完全枯乾時，然後在蔥頸上留四、五分長，以剪刀剪除葉部，即可包裝，供貯藏或運銷之用。

(二) 人工風乾：蔥球收穫後，要提早販賣，或由於氣候潮濕，無法風乾時，必須應用人工風乾法，可以防止「蔥球頂腐病」的發生。就是把收穫的蔥球，通入乾燥熱氣（熱氣溫度華氏105.—110。）經過十五小時，即可完成。本省可利用稻谷乾燥機，或加工用乾燥機處理。

(三) 貯存：為避免因大量生產而價格低落，可用貯藏方法。風乾後蔥球，經分級包裝後，即可放入冷藏庫貯藏。冷藏溫度為華氏33.—36.度，相對溫度七〇%—七五%可以貯藏八十日之久。

(四) 包裝：風乾處理後的蔥球，應依大小和品質分級，並剔除發芽和敗壞的蔥球，然後包裝運銷。省內運銷，用中型竹簽裝，最為理想，每簍可裝蔥球三十公斤，如短期內可銷售的，用草袋包裝，最為經濟。運銷省外或貯藏用的，應以木箱裝箱，可減少損傷，每箱實重四十五公斤等。