


桃園種母豬



本地豬的品種，最普通的桃園種，美濃種和雙溪種，但有許多血統已經混雜，目前正從事育出這三種純種豬。飼養本地豬的目的，是以良好的管理選擇的方法，來改良並增產本地母豬，以交配盤克夏公豬，產生雜種仔肉豬。

純種本地豬生下的小母豬，很容易以高價售出，仔公豬也可以留做配種之用，經過改良選種的優良本地豬，目前很感需要。

每一種豬有牠的優點，也有牠的缺點，決定飼養三種本地豬種中那一種，除了個人的興趣以外，應該注意到各種本地豬的分佈地區。你如住在基隆市附近或宜蘭縣，那麼你很容易找到雙溪種，也很容易把你的雙溪種仔豬賣到市場去。假如你住在桃園縣或是新竹縣，那麼你最好是選桃園豬種。

原產桃園，體型中等，成肥豬型，體格結構良好，易於肥育，一般為純黑色，體軀較深，體幅寬，背略凹下，背線比雙溪種弱，但比美濃種強。頭中等大，而形分明，有不定型的皺紋，鼻略成碟形，耳大而垂伏，繁殖力強，平均每胎均在十頭以上。

蒲扁的期時接嫁於適台(右)接種西和(左)本



(一圖)

原產桃園，體型中等，成肥豬型，體格結構良好，易於肥育，一般為純黑色，體軀較深，體幅寬，背略凹下，背線比雙溪種弱，但比美濃種強。頭中等大，而形分明，有不定型的皺紋，鼻略成碟形，耳大而垂伏，繁殖力強，平均每胎均在十頭以上。

(二) 葉木種類的選擇：西瓜雖可和其他瓜類嫁接成活，但是用扁蒲(匏仔)作為臺木的成績最好。扁蒲的臺木，不但比其他瓜類容易和西瓜嫁接，成活後的發育也很好，品種以長型種較佳，因爲長型種的生性比較強壯。


(三) 葉木的養成：扁蒲(臺木)的種子先經催芽後，比西瓜約早十二日播種在西瓜田，瓜田的整地方法，和普通栽培的整地相同。



(三圖)

二、嫁接的適期方法

(一) 嫁接的適期：嫁接時的臺木和接穗的生長大小的程度，依筆者的經驗，臺木在真葉二十三葉時最為理想，接穗以「子葉」展開而未生真葉時為適宜(圖一)。實行嫁接



時發生，且植株生長勢力，較普通西瓜旺盛，產量也可能增加。對於這方面有興趣並有相當技術的農友，可以先做小規模試驗，待日後確實有把握時，再行大規模栽培。本文作者曾在鳳山園藝試驗所做過試驗，成績很好，並在屏東下淡水溪做過小規模的示範栽培，所以寫成專文，以供農友們參考。

農業智識

西嫁接栽培

——陳文郁——

接木西瓜不但可以完全防止西瓜栽培上最可怕的「蔓割病」發生，且植株生長勢力，較普通西瓜旺盛，產量也可能增加。對於這方面有興趣並有相當技術的農友，可以先做小規模試驗，待日後確實有把握時，再行大規模栽培。本文作者曾在鳳山園藝試驗所做過試驗，成績很好，並在屏東下淡水溪做過小規模的示範栽培，所以寫成專文，以供農友們參考。

砂丘(如新竹、臺南)或溪床(如屏東下淡水溪)的地區，很適於栽培西瓜，但是因為病害的關係，不易得到優良的成績。

臺灣現在的西瓜病害，最嚴重的是蔓割病(南部稱為敗株、敗頭、死株等)，普通多在果實約釘碗大時最嚴重，損失很大。嫁接栽培可以防止蔓割病為害，植株生長旺盛，產量可能增加。

一、嫁接的準備

(一) 嫁接的準備

(二) 嫁接的準備



(三) 嫁接的準備

尺以上(沒有灌水的地方較小)。一植穴播下種子三四粒，使每一植穴能生成三株以上的臺木。種子的播種間隔，須要在十公分以上，因為過密

時發芽後的臺木幼莖徒長細弱，接合困難，且接木操作也很不便。播種約五日後，即展開「真葉」，這時候用二〇倍的硫酸銨溶液施肥一次，以促進臺木的生長，其他管理和一般瓜類相同。

二、嫁接的適期方法

(一) 嫁接的適期：嫁接時的臺木和接穗的生長大小的程度，依筆者的經驗，臺木在真葉二十三葉時最為理想，接穗以「子葉」展開而未生真葉時為適宜(圖一)。實行嫁接



差。
原產基隆市
南方的雙溪鎮，
也是一種黑豬，
體軀長而狹，外
形比其他二種粗
糙，背線比桃園
種及美濃種直，
繁殖力比桃園種

雙溪種

美濃種，體黑色
，體型比桃園種
及雙溪種小，背
凹下顯著，後肢
比桃園種強健，
性情較野，行動
迅速。繁殖力比

桃園豬及雙溪豬
強，平均每胎在
十頭以上。目前
美濃鎮農友正在
組織一個養豬協
會，計劃用桃園
種公豬來配種美
濃母豬，以改良
當地的豬種。

會正致力改良桃
園豬種，該會會
址在桃園縣政府
建設局。

美濃種

原產高雄縣


日，扁蒲(臺木)播種
後十七日左右開始。
接木的時間，在陽光
較弱的下午四時以後
，無風雨溫暖的時候
最適宜。

(二) 嫁接的方法和順序：

①嫁接用具：①小刀(選薄而
銳利的刀片最好)(圖
二)，②麻絲(質地愈
軟愈佳)；③清水一

盆；④覆蓋物(應用輕便而能防風雨遮日的東西)。


。



熟練後，接後的氣候溫暖，即可有九成以上的成活率，一人一日約可接八十株以上。

三、接後的管理和栽培

無風，無雨，陰濕，高溫為西瓜接木後癒合成活的重要條件，所以接後須要加被覆(目的在遮陰，防風，避雨和保溫)，每日最少灌水一次(不可澆到接木苗)。覆蓋的期間約五日，除去覆蓋後的接穗，若不萎凋，大約已經癒合生長。生長早的，或已有新葉發生。這時候要小心解去繩繫物，以後如風勢較強的地方，須要防風設備，以免癒合的接穗被風搖動枯萎。新葉發生後用極稀薄的液肥，施肥一次，如用硫酸銨，每一〇〇公分和水二斗，一植穴的施用液肥量約五〇〇公分。經一星期後再追肥一次，濃度和用量約為第一次的二倍，追肥時肥料切勿灌到莖葉上。接活後在接穗有真葉四、五葉時，實行間拔，一植穴只留優良的嫁接苗一株。如有缺株要行補植，如臺木有腋芽發生，應隨時剪去。間拔後瓜蔓就很快的伸長蔓延，以後的栽培管理都和普通西瓜相同。因為扁蒲臺木的接木西瓜，較普通西瓜生性強健，生育旺盛，所以施肥量不須增加，產量亦不會減少。一株大果種的西瓜，結兩個優良的果實，並無困難，瓜的風味也和普通西瓜一樣。請農友們先行小規模試驗，如成績良好，再來正式應用。



(圖五)接合法：①接合應使接穗和臺木的表皮能平行而密合。②繩繫要鬆緊適度，不可搖動接穗。③接合後要行

設網蓋，以防風雨和日光。