

小越瓜

陳文郁



小越瓜在排水良好的砂質壤土，生長最爲理想，產量最多。排水不良的粘質土，雨水多時根部和果實容易腐敗，不適於栽培。播種期在高溫和日照充足的地區，三月至八月最爲適宜，利用夏季水田裡作，最爲有利。播種法以直播較好，土壤耕鋤後作高畦，畦幅一〇〇公分，株距五〇公分，每一株掘穴施下基肥。種子播種前宜行催芽，促進發芽整齊。播種時種子平放，每穴播四、五粒，每十公畝（一分地）的播種量約三合（二五〇公分）。一分地的施肥量和施肥法如下（單位：公斤）：


[illegible]

瓜苗在真葉約二—三葉時實行間拔，每次留二株。摘心在親蔓（親蔓就是最先生出原來的主蔓）六葉時施行一次，以後就任它結果。除草中耕須在瓜蔓未繁茂時充分施行，追肥後行培土，數草宜在第三次追肥後施行。生育期中須注意澆排水，雨後並撒布砒酸鉛，防除瓜守（紅龜仔）爲害。

播種二個月後開始收穫，採收的果實以果實橫徑在一·五公分左右的爲上品。過熟時種子發達，品質粗老，價格低廉。每二日採收一次，採收期間約四十日，一分地的產量約二千公斤左右。採收後的果實，如不能隨時賣出，可用食鹽處理貯藏。先用鐵絲把瓜果刺傷（一果約五、六處），使鹽分容易滲入內部。桶內先鋪瓜果，鋪到二〇公分厚時撒鹽一層，裝滿後上面用石頭壓緊。三日後上下翻轉一次，加鹽，每隔三日，再翻轉加鹽一次，共翻三次，翻後壓緊。每一百公斤瓜果，鹽量共需三〇公斤，處理後的瓜果可貯藏六個月以上。

土蘭師扶朗多旺

土蘭師扶朗多旺的效力



◇處理適期播秧前五日內

◆每甲一畝只十八元 ◆試作用一包(五分地)十元


- 請看卓越的豐收情形，在全省各區鄉鎮農會設置的本藥示範田
- 第二期稻作迫近不要錯過施用「土爾舒扶朗多旺」以便增收，各農會舉行講習會時請通知本行，以便參加講解植物荷爾蒙劑處理法
- 大豐植物荷爾蒙實驗農場在臺中縣大里鄉竹仔坑，歡迎隨便參觀

☆各種說明書及士蘭師扶朗多旺樣品函索即寄請附郵票1元

大 豐 農 藥 行

臺北市寧夏路23號 電話：42161號

專營



小型噴霧器

用途

◎家庭園藝用
◎洗染店仕上用
◎加工業仕上用
◎消毒用

◎金澤結頭菜子(由日本到了)

其他日產各種菜子陸續入貨

各種 白菜類、菜頭類、蕃加、旱生甘藍、胡瓜類
花椰菜類（種類繁多不克備載）應有盡有

贈送見本請向郵局劃撥匯二元即寄上一份(一種)

蔬菜栽培一覽表，價格表等附郵票四角函索即寄

日製噴霧器零件全備

包辦修理廉價供應

臺北市永昌街2號（永樂市場內）

蓬萊農產行 林辛乾

郵局劃撥儲金臺八八三七號 電話44837號轉