

Figure 2 consists of three vertical illustrations. The left illustration shows a wooden stem with a small, dark, oval-shaped stone nut graft being inserted into a hole. The middle illustration shows a similar stem, but the stone nut graft is now fully integrated into the wood, and a small, dark, oval-shaped hole is visible on the surface. The right illustration shows a stem with a large, dark, oval-shaped stone nut graft being inserted into a hole, with a small, dark, oval-shaped hole visible on the surface.

如何改良番石榴的品質

公尺以上的枝條宜行剪去，以免樹形過高。剪去上枝可以促進下

（續上期）

三、適當

的繁殖

方法

番石榴繁

殖的方法，雖

有①嫁接，②

實生，③扦插

三種，但以嫁

果實優良。番

四、管理的要點

嫁接的成活率可達百分之七十至八十，成活後經小心管理，生長滿一年，即可定植於本園。株行距均以五公尺爲宜，最少亦需四公尺（每公頃六二五株）。定植後一年，即可開花結實。

(1) 整枝修剪 幼苗株條三〇至四〇公分以

下萌發的新芽，都要除去，使成單幹，在其上留新枝三至四枝斜向上方，形成主枝。各主枝長六〇公分左右時，實行修剪，使形成「杯狀樹形」。每年於冬季修剪一次，剪去枯枝及老弱枝。高過三、四

枝不定芽的萌芽，使保持一定的高度及樹形，主幹近地處發生的芽，也要除去。

(2) 蟲害的防治 注意防治吹綿介殼蟲，圓褐介殼蟲及天牛，參看本刊各期刊載的防治方法。

(3) 施肥 地力中等的土地，七、八年生的樹，每株每年的施肥量舉例如次：堆肥二〇公斤，豆餅八〇〇公分，過磷酸石灰六〇〇公分，草木灰一公斤，早春時在樹的四週施下。結果二〇年以上的老樹，如樹勢已弱，應行更新一次。冬季春季之間，剪去上部枝條，只留主枝，加施上述肥料的一倍，使春間萌發多數新枝，然後選留強健的枝條，這樣可以恢復結果的能力。

洋蔥葉枯病、腐敗病等一切病害特效藥

△最新超強力殺蟲劑（滅除一切害蟲）

△野鼠用最強力殺鼠劑 △有利的

鼠拉倒爾

◎優良蔬菜種子

美國胡蘿蔔
美國胡蘿蔔

美國露地香瓜
美國露地香瓜
△△△

美國加州大甜椒

美國各種草苗(チシヤ)

其他各種夏季種子、農具、

「商品目錄或說明書」附

!!音福者培栽葱洋◎

◎優良蔬菜種子

美國胡蘿蔔
美國胡蘿蔔

美國露地香瓜
美國露地香瓜
△△△

美國加州大甜椒

美國各種草苗(チシヤ)

其他各種夏季種子、農具、

「商品目錄或說明書」附

商易貿材資產生業農營專一唯省全
司公業企產農灣臺

號六五二段一街化迪市北臺
三五二四四：話電 三五九一灣臺儲劃政郵
號五五街春富鎮原臺：處銷經縣中臺
行商昂陳
號三一里華光鎮湖溪：處銷經縣化彰
行商美華