

農友們種試請

嫩莖高

· 郁宗雄 ·

一、九十月開
始播種

育緩慢，嫩莖較細，容易失敗。中南部播種適
十月上旬至十二月上旬；如在十二月下旬以
後播種，因低溫多雨關係，發芽不良，苗子生

季裡作栽培

嫩莖高莖（萬
筍），和普通栽
培的萬莖（萬仔菜
）不同，莖部長得
特別大而肥嫩，品
質非常清香脆爽。

本刊四卷十五期介

紹過它的栽培法，
這裡再提出栽培上
應注意的事項，給
要栽培的農友們參
考。



期，自十月中旬至一月中旬；如過早播種，種子因高溫發芽不良，生育較弱；如過晚播種，因生長後期溫度過高，嫩莖細小。高冷地播種適期，自九月至十月。嫩莖高莖很適宜在高冷地栽培，去年，南投縣霧社鄉農會採種圃栽種的，每株嫩莖重達六〇〇公分（一臺斤）以上。

一、養成強健的幼苗

活潑壯健的幼苗，才能長成肥大的嫩莖。所以苗床土必須肥沃、疏鬆、膨軟，才能養成強健的幼苗。苗床內幼苗不可太密，要陸續間拔成苗距七至八公分四方。苗床不可乾燥。雜草要隨時拔除。施肥不可太濃。本葉四至五片時定植。老苗缺少活力，不可延誤栽植適期，早栽較為妥當。

三、冬

季裡作裁 植最有利

嫩莖高

莖，自定植
至收完，北
部約須七十
天，中南部



火西國真阿母

壬火西國真阿母

叫（要）卜，痛陣陣肚腹蘭阿③
勸菊阿，（產助）子生來婆產
何）獅那然自子生，聽嚙攏伊
。驚（必

難生醫着看，經正雖查檢前產②
次各，英阿林婦產壁隔，情爲
。生醫免產生

姊大，（孕）身有已蘭阿妹小①
勸姊阿，（切親）親有真菊阿
要查檢前產，慎謹（應）着妹
。真認

，最為有利。嫩莖高莖不可連栽，日照須充足。

選大苗（不是老苗）栽植。帶上掘苗，儘量保留宿土。行距至少五十公分，株距至少三十公分，株行距太小，嫩莖高莖就長不大。栽植工作應精細，栽後應立即灌水。

四、多施堆肥，避免忽乾忽濕

本田也應多施腐熟堆肥作基肥；如不用堆肥，土壤緊實，嫩莖不能十分肥大。追肥多用氮肥，可以硫酸銨或豬糞尿為主。施肥不可短少。

生長期不可缺水，須經常保持半乾濕狀態。如土壤忽乾忽濕，容易引起裂莖，甚至腐爛，減損商品價值。生長初期要淺中耕，只要鋤鬆土面就可以。生長後期，不可再鋤動土面。如栽培目的專在採收嫩莖，生育期中絕不可剝取下部葉子供食，如果剝取下部葉子供食，就會阻碍嫩莖的發育。

五、施用硼素預防莖部腐爛

嫩莖高莖在各地栽培，常發生硼素缺乏症而使莖部腐爛，尤其在少用有機質肥料時，腐爛較多。缺硼時，生長初期並無異狀。以後發病時，先在接近地面的莖中心發生水漬狀症狀。嫩葉主脈及葉緣生長衰緩，葉面皺縮，葉緣反卷，葉色濃淡不勻。上半葉葉邊先發現褐色小斑點，葉尖開始焦枯，漸次延向下邊葉緣。頂芽生長稍受阻抑，發生多數分枝。莖內部漸變淡褐色，濕性軟腐成空洞。最後在種子成熟期，莖部折倒潰死，不易採到種子。缺硼嚴重時，在未抽苔開花前就腐死。只要到西藥房裡買幾塊錢硼砂（大約十元一公斤），作為肥料施用，就可以防治這

種病症發生。硼砂施用量，最好參考第一年缺

硼程度來決定。如發生缺硼症時，大概一公畝地施用硼砂○一至○二公斤（三至四臺兩）已足夠。施用方法：把一半硼砂作基肥施用，稀釋後，洒在葉面和畦面就可以。硼砂施用量

不可過多，並應均勻施下。如施肥過多，或施用不均勻，對於不耐硼素的後作有害。（未完
、下期續）


◎日本美國等優良種子已入荷！

- ◎長岡交配一號甘藍
- ◎純黃葉三池中生甘藍
- ◎三年子サクセックンショヨン甘藍
- ◎極早生獻上花椰菜
- ◎美國早中生兼用花椰菜
- ◎京都三號結球白菜
- ◎金澤粗蘭結頭菜
- ◎美國大型五寸人參
- ◎美國紅心五寸人參
- ◎美國嫩莖高莖
- ◎夏播豐豐節成胡瓜
- ◎丸葉山東菜
- ◎本白莖山東菜
- ◎洋蔥栽培上必須要的特効藥
- ①種子消毒用ルペロン錠劑
- ②各種病害特効築ルペロン乳劑
- ③最新安全強力殺蟲劑
- 馬拉松乳劑 地亞淨潔乳劑

正日產トマト等植物補爾檬均有
◎其他各項優良種子優秀農藥農具均有詳細請閱
目錄「目錄附郵票一元函索即寄」

臺北市迪化街一段八六號

郵政劃撥全金（農業資材）
一九七九年三



仔叟險危人大，時過已院病到魁⑥
着看家大，兒孩男個一了死，死
。（惜可）四寫無

入去緊趕伊勸，意主出時一菊阿⑤
院入緊趕，死會就院入無若，院
。遲必莫

是但，害厲真（得痛）甲痛蘭阿④
喚請法無婆產，來落（不）喚仔嬰
不）代呆真着想菊阿，知（不）
。（妙