

禽家

怎樣防治雞「眼蟲」？

問：我飼養的一群雞，發現有幾隻的眼睛眼白裡有許多白色細長的小蟲，眼睛紅腫發炎，精神萎靡，食慾不振。附上蟲樣，請問這是什麼蟲？怎樣治療？（高雄李承妹）（桃園觀音鄉李秋亮）

答：你的雞是被「眼蟲」所侵害。這種蟲寄生在雞的眼眶內，刺激眼球，使發炎紅腫。為害嚴重時能使雞失明。這種蟲的卵極小，肉眼不可見，但可用局部麻醉劑（如丁卡因）滴在眼內，接着再用百分之五的克速林（Greslin）液滴二、三滴在眼蟲身上，就可以殺死眼蟲。但是因為這種藥刺激性很大，用藥後須用清水即時沖洗眼睛。米丁和克速林在各大藥房都有發售。

眼蟲的中間宿主是螞蟥（アブラムシ）。雞吃了螞蟥才有傳染眼蟲的可能。所以要預防發生眼蟲，不僅要經常掃除糞便，同時要清除雞舍和場地內的堆積物，使螞蟥沒有地方可以躲藏，根絕此種害蟲的傳染。（省農試驗所李登元）

問：①漆樹的經濟價值怎樣？②本省中部可以種漆樹麼？③漆樹怎樣栽培管理？④漆樹的種子或苗木何處有售？（南投縣國姓鄉戴春和）

答：①漆的用途很廣，如漆器、建築物、汽車、火車、軍艦、飛機以及軍事上的種種機械，都必需用漆作防腐防病的塗料。所以漆樹是國防特用樹種，極富經濟價值。現在本省需用量很大，值得推廣栽培。

②在本省中部可種安南漆，生長良好。

③漆樹的栽培方法：十至十一月採種，一公升種子約有四千粒。在二月播種。播種前把種子放在流水中浸一星期，然後播下。發芽率約有百分之六十至八十五。

造林用一年生苗高約〇·三一·三公尺，修剪苗木枝葉或截幹。林地選擇，北部海拔〇一二百公尺，南部海拔〇一七〇公尺。種在東南向少風的山坡上。土壤宜濕潤肥沃雜有碎石，透氣良好，而富於腐植質的砂質壤土。陽光充足。如果林地條件良好，將來漆液量多而品質良好。

造林的時期，北部在十二月，南部在三、五月。株行距為一·六×二·〇公尺（或一·五×三·〇公尺）。雨季或秋天注意補植。造林的第一、二年須刈草二、三次。刈液三年後就要更新。忌連作。造林後第四至六年可採漆液三三〇公升。

④安南漆種子或苗木可向省林業試驗所連華池分所主任潘家聲先生或嘉義中埔分所主任程連瑞先生洽購或請伐採。

農業試驗所李登元

小雞多大接種雞痘疫苗？

問：①雞痘的預防接種疫苗那種有賣的？價格多少？手續怎樣？

②小雞多大可以施行雞痘預防接種？小雞多大可以接種？兩者是否可用同一種疫苗？

③雞痘苗的有效期有多久？怎樣保藏？

答：①雞痘疫苗在臺中員林畜牧生產合作社獸疫血清製造所有出售。十立方公分裝的每瓶單價八元，二〇立方公分裝的每瓶單價十五元。可逕向該製造所函洽。該所有函購辦法，付足價款即可郵寄。

②通常雞痘四、五個星期的年齡，就可以施行雞痘預防接種。火雞應在孵出後四個星期施行雞痘預防接種。普通雞與火雞的接種雞痘疫苗是一樣的。

③雞痘苗的有效期為半年至一年。各廠出品均有詳細說明，請注意。至於保藏，應放在冰箱中比較妥善。（李登元）

怎樣栽培漆樹？

甘偉松

士蘭師扶朗多旺

用途：菸葉、蔬菜、洋葱、果樹、苗木之移植及生長促進用，提高活著率，增加收量。
注意：試用品函索即寄（請附郵票2元）

鳳梨多旺

用途：促進鳳梨開花結實，使用簡單，節省費用，代替電土法，增加收量。

蕃茄多旺

日本特許 19600 號
夏季トマトの救星！保證防止落花。
注意：請注意有偽牌或偽造品，希逕向敝行及指定經銷處購買，或向貴地農會申購。

☆其他各種說明書函索即寄

大豐農藥行 臺北市寧夏路 23 號

遇暴風雨淹浸，倒歪或斷根的果樹，蔬菜；請速使用植物生長荷爾蒙劑「士蘭師扶朗多旺」，必提高其成長及復活率。

優待豐年讀者！！

先送後付優良蔬菜種子辦法

一、請將下面訂購單剪下，書明所要事件，寄來本店。二、所購種子價款，可以延至本年年底繳清。三、每人限購總值六十元以下。四、蔬菜種子，種類如下：白燕球莖甘藍、美濃早生大根、大梅花蘿蔔、美國大五寸胡蘿蔔（人參）。五、價格依照四十五年度興農園藝新智識報價表。

興農園藝新智識附郵票一元函索即寄

興農種子行

臺北縣三重鎮

重新路一段四八號

郵政劃撥儲金四〇二八

訂購單

白燕球莖甘藍	兩
美濃早生大根	兩
大梅花蘿蔔	兩
美國大五寸人參	兩

訂購人姓名
住址

元 元 元 元

茲向興農種子行採購種子如左其價款儲四
五十二年十二月三十一日前繳清無誤謹此為據