

壓而凸出來，再用食指與母指緊緊捏住突出來的舉丸（看圖二），然後用右手拿手術刀在離開左右舉丸的縫合線約半公分，和縫合線平行切下一刀使舉丸實質部露出，如不露開時，要再開刀使其露出。次一步驟是切斷精系，就是先用絲線緊縛精系（看圖四），然後用手術刀切斷離開結縛約一

公分的精系，這樣舉丸及副舉丸便一並割除掉，並不流血。用同樣方法可割除右舉丸。最後，用紅藥水塗擦傷口就算完成手術。傷口不必縫合。如沒有紅藥水，可用其他藥品，如油性配尼西林，配尼西林藥膏，硼酸軟膏等代替，但不可用有刺激性的藥品，因為傷口受強烈刺激就會阻碍痊癒。


採收後香蕉莖的處理

· 薑平 ·

香蕉成熟收穫後，香蕉莖必須好好的處理，才不會損失肥分，提高香蕉園的收益。

香蕉收穫後應沿塊莖（根頭）上部一、五公尺的地方砍除，然後把砍下來的莖葉切細，覆蓋在植株周圍，並蓋薄土一層（如圖），這樣既可以防止香蕉園中土壤水份的蒸發，莖葉腐爛後，又可以增加土壤的肥份。殘株砍除後三、四週，香蕉莖中的養份，都已流入塊莖內部，這時就自地面砍平香蕉莖，並且切細，如上述方法鋪於植株周圍。

香蕉莖砍除後，吸芽就迅速地生長。吸芽數目不定，或多或少（吸芽普通叫做苗子），每一母株，祇可選最優良的吸芽一至二個，使發育成新植株，其他多餘的吸芽，都應該剪除。



地的尺公五，一部上莖塊沿，後穫收蕉香
土薄蓋並，圍週株植在鋪，細切，除砍方。層一

四、手術後的管理

手術


後傷口痊癒前，仔

豬應養在

豬舍內，

不可放出

運動。這



九舉出擠後開切囊陰：三圖

時豬舍要時常保持清潔，豬體也應保持乾淨，但不可用水沖洗。去勢後一星期內，傷口有時會稍腫，但不久就會消退。

仔豬去勢後，其他的豬常要舐啃其傷口，但沒有多大影響。去勢後，有時會流血，但不太利害，這是因為結縛不緊或結縛的絲脫落的關係，所以結縛要做的妥善，精系的切斷位置不可太近結縛部位。

去勢後一星期，傷口如仍相當腫大而不見消退時，應用配尼西林藥膏或紅藥水塗擦消毒，或注射配尼西林及其他消炎劑。

手術後，如給與容易消化而美味的飼料，是最理想的，但給與普通飼料也沒有關係。

五、預防破傷風症

去勢後的仔豬常發現破傷風症。普通在去勢後一至二星期發生，十日前後發生最多。發病初期，仔豬步行

困難，嘴不易張開，難吃飼料，尾巴不能左右擺動。病症進展時，由口角吐唾液沫，口不能張開，最後四腳強直，不能起立，呼吸困難而死。

病症的經過有急性型和慢性型兩種，急性型經過二十四小時死亡，慢性型二至三日或一星期死亡。

去勢時，器具、手術者的手，和去勢部位等如經嚴格的消毒，去勢後豬體保持清潔，就可以完全預防破傷風症發生。

如發病，應早期發現。發現後，切開去勢的傷口，排出膿液並消毒，再注射配尼西林（ベニリン）每日三十至六十萬單位（頭一次注射水性一支，以後每日注射油性一至二立方公分爲好），並皮下注射破傷風血清二立方公分。



四圖：用絲線結縛精系後，用手術刀切開精系

更正啟事

本刊第六卷第廿三期第十頁「役用馬的飼養和管理」文中左下表「食鹽」用量單位「公分」誤排爲「公斤」，特此更正。