

茶苗在田間當日不能植完，或因天氣轉晴，或留待次年補植的（普通應多備十五%的幼苗做補植用），必須先假植。假植苗圃，應選遮蔭、背風，較肥沃的地區。掘溝，行距三十公分，株距二十公分，隨時假植。

七、小櫟適度密植

許多茶農，爲了定植後，能早日採摘，往往把幼苗七、八株同植一穴。這種大櫟定植法，雖在定植後二年內就有新芽可採收，但是將來主幹發育不強壯，分枝細小，尤其因茶樹還沒發育健全就採摘



徐石生

我是這樣種葡萄的

苗栗縣苗栗鎮

徐石生


我種有那加拉和華盛頓夫人兩種葡萄。這兩品種，產量多，含糖量高，果房和果實都大，很適合本省栽培。

據我的經驗，栽培葡萄的土質，不可過粘，也不可過砂；半泥砂的土地最好。排水一定要良好。葡萄到冬天，全部葉子都掉下來。等完全落葉，才能移植。我在冬至前後到立春前之間栽植葡萄。

新開墾的肥沃地，開深六十公分，寬六十公分以上的穴或溝，放進雜草，再填加肥土到比原來地面高十五公分。舊園地就搬來客土或堆肥，改良土質。貧瘠的土地，行距十二臺尺，株距九臺尺，每公頃約種一千株。在肥沃的地方，株行距各加寬一、二臺尺，每公頃栽植七、八百株。

種植第一年，我沒有正式搭棚架。用桂竹末端八、九臺尺長（枝要留存），削尖下方，插入離植株一、二臺寸的土中，做支柱。另外再插三、四臺尺長竹竿一支，和支柱繩在一齊（如左圖）。時常除草、中耕、施肥，就可以促進葡萄的生長。第二年，在發芽前，以植株爲中心，半徑三臺尺的周圍，要全面中耕。三臺尺的外圍，深耕開溝，施堆肥、肥土，和腐熟鷄糞等。

- 過度，所以枝幹生長衰弱，茶櫟細小，無法形成標準的樹型，且很容易衰老。本省茶園單位面積的生產量低，「大櫟定植」和「早年採摘」也是主要的原因。所以，要請各位茶農「小櫟適度密植」（請參看本刊上期第七頁：怎樣決定株行距），既可使茶樹生長旺盛，成櫟早而健壯，又能保持水土，提高單位面積的生產量！
- 喬木性的阿薩姆種或新雜種，應該單株定植。（三至四支或單株），放入植孔中央，一手握植株，一手把準確的樹型，且很容易衰老。本省茶園單位面積的生產量低，「大櫟定植」和「早年採摘」也是主要的原因。所以，要請各位茶農「小櫟適度密植」（請參看本刊上期第七頁：怎樣決定株行距），既可使茶樹生長旺盛，成櫟早而健壯，又能保持水土，提高單位面積的生產量！
- 在溝邊的細潤心土，用移植鏟翻入根邊，用兩腳踏實。
- 經二、三次翻土踏緊，至幼苗不易拔起，再用鬆土覆蓋。
- 八、定植前後注意十項**
- (1) 茶農們應依據定植的面積，預先估計所需的人工及日數，俾能如期定植完竣。普通每人每日可掘孔二〇〇至三〇〇孔；取苗一〇〇〇至一五〇株；定植三〇〇至四〇〇株。
- (2) 定植時，如果植孔乾燥，應先澆水使潤濕。
- (3) 每孔種壓條苗三至四根最適宜。各根間應保留二至四公分的距離。
- (4) 根部有腐爛的部份，或實生苗主根長度在三至四公分以上的末梢，可剪除。
- (5) 山地茶區，用壓條苗定植時，根部彎曲部份的方向，應和斜坡方向相一致。
- (6) 定植時，必須先摻用細潤心土，踏實後，再用鬆土覆蓋。
- (7) 定植後，地上部應離地面二十至三十公分平剪。
- (8) 定植後如果天晴，應立即澆水覆蓋。
- (9) 本省茶園，定植後管理上最應注意的是防旱。淺耕鬆土，除草覆蓋，及澆水治蟲等工作，應適時舉行。
- (10) 定植後三至五個月，如果氣候與幼苗生長正常，就可施用稀薄的液體肥料。（全文完）



少苗大孔：法植定的新茶苗