

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，以便本社收發迅速處理。

矮種高粱種子 什麼地方供應？

問：貴刊第七卷第十七期報導「純種矮高粱最近即可推廣」，種子何處可以購買，價格大約多少？（嘉義縣太保鄉黃財）

答：美國矮種性高粱目前在本省推廣的主要品種有(Coby及Westland)二品種，推廣地區為臺東、花蓮、臺中等地區，臺南地區沒有正式推廣。農友們如有興趣可少量試種作農作物防風之用，種子可向一臺中縣新社鄉農林場苗圃繁殖場洽購，少量者可向臺南區農林改良場洽購。（吳國璋）

問：貴刊介紹磷肥是豆科作物的好肥料，請問簡單的施用方法。（高雄縣湖內鄉林寬發）

答：磷肥應在豆科作物種植前施用。為經濟利用肥料起見，可採用條施方法。磷肥用於豆科作物時，施放位置宜較深（約五、六英寸），因為豆科作物根系發展較深，如施肥太淺，便無法利用。磷肥可以用在砂質土壤的旱地上，但如土壤質地太砂，宜併用些堆肥，效果可以更好。（李廷清）

問：我家門前種有十株香蕉，其中有一棵兩個月前葉幅變小，葉緣變淡而枯乾（本地話叫反種），這種香蕉結的果實很小，為什麼會變成這樣，有什麼方法可以預防，治療？（屏東市復興路劉景標）

答：這是香蕉萎縮病，並無良好防治法，應換種具有抵抗性的仙人蕉。（蔡致謨）

問：夏油乳劑剩下很多，留存至年底是否會變質？應如何保存？（彰化縣溪湖鎮陳振豐）

答：保存夏油乳劑，必須密封，每星期上下更動位置，並放於較冷暗處，而不分離者，以留至年底使用。現在有高級夏油和普通乳劑一樣，可以久置不壞。（陶家駒）

問：三國大豆二期作下雨天中耕除草，對大豆的生長與結實有無阻礙？（花蓮縣光復鄉吳四郎）

答：雨天土壤濕潤，如行中耕，會使土壤固結，大豆根部未能充分蔓延，水分及養分（肥料）之吸收均受影響，生長不良。同時，雨天中耕未能兼收除草的效果，致雜草吸收大豆應攝取的養分及水分，所以，雨天不宜中耕，雨天中耕對大豆的生長與結實均有妨礙。（劉文慶）

問：吳郭魚被安特靈殺蟲藥中毒而死，還可以吃嗎？（臺南市許永福）

答：安特靈殘留性很強，因此藥而毒死的吳郭魚，不但人不能吃，也不可作為家畜的飼料。（曾炳耀）

問：我想利用鍋巴（飯皮）養雞，應怎樣餵給？（高雄縣鳳山鎮薛兆年）

答：用「飯皮」餵雞，比用剩飯好，飯皮可以應用百分之四十，如利用剩飯，不應超過百分之二十。（黃立寧）

問：現在是不是栽培燕青的適期？（高雄）

答：燕青現在是適期。

問：現在是不是栽培燕青的適期？（高雄）

答：燕青現在是適期。

問：現在是不是栽培燕青的適期？（高雄）

答：燕青現在是適期。

臺中區農林改良場 蘇魯種木瓜 改良苗供應！！

蘇魯種木瓜

改良苗供應！！

親愛的農友們：敝園自繁殖供售新興的「蘇魯種木瓜」以來，雖是日淺尚 蒙各地同好

關顧與讚許甚至感謝。惟過去栽植情形因育苗方法，寄運中的損傷，及農友栽植過深等

略有缺安致使少些枯死，實為遺憾。

改良苗出現：為提高成活率，請余先生指導，竭力改善育苗方法（剪尾、間拔、移植）

竟育成一批粗大多根的強健優良苗供應各位。請參閱改良苗圃照片。

本種的特點：早生——栽植後三個月就開

始結果。

豐收——第二年可收一五〇臺斤左右。

矮生——可耐風，而且四季連續結果俾助農友

不斷的收入等好處頗多。請參閱豐年報第七

卷四期十九頁及照片。

用途廣汎：生食非常滋養美味，加工用途甚廣（本園擬設加工廠收購）又將摘

果餵豬刷糞混合米糠壓入水缸，每四五英寸厚加添少些食鹽使其發酵七天供做

飼料，頗為適宜，於八月二十五日聯合版臺南糖試所某高級人員發表談話，實有

百利而無一害云。

適合間作：若間作於

鳳梨園（每甲約七〇〇

株）絕無影響却獲到兩

全其美，或是茶園等之

間作均可適合，增加莫

大收益。



改良苗圃



栽植後八個月結果狀態

彰化縣溪湖鎮農會 謹啓

通訊處：彰化縣溪湖縣湖西里一〇〇號