

五、日常管理的要點

(1) 兔籠應該保持乾燥、清潔、空氣流通。
(2) 用具及兔舍應常消毒；兔籠可在日光下曝曬。

(3) 雨季的青草類，含水分過多，如在下雨後採集青草，也附着多量雨水，必須涼乾後飼餵。

(4) 大多數家兔，都在秋季九至十月間換毛，仔兔也在生後一至二個月脫去幼毛，產生新毛。在此換毛期內，必需給與富含蛋白質，容易消化的良好飼料。母兔在此期內，最好不要配種，而且因換毛時期的家兔容易感冒，尤需注意保暖。

(5) 仔兔普通在生後四十至五十天離乳為宜。有些農友，為增加分娩次數，常提早在二十五至三十天左右離乳，結果往往引起母兔及仔兔的營養不良，甚至死亡。

十天左右離乳，結果仔兔發育不佳，死亡率增高。尤其是留作種用的家兔，更不可過早離乳。

離乳不過操之過急；第一日先把母兔移至他籠，只在早晚帶回原籠中三次，與仔兔共處片刻，再行分開；至第二日，再減為二次。以後完全隔離，離乳就算成功。

(6) 離乳後的仔兔，可仍舊放在一起飼養，到三個月以後，公母必須分開飼養。仔兔雌雄的鑑別法，請參閱上期本刊。

(7) 捉兔時，不可只用一手提住兩耳，尤其是妊娠的母兔，很容易因此流產。合理的捉兔方法，如圖三所示。

(8) 如以吃肉為目的，公兔可在生後二至三個月去勢，以促進生長，增加肉量，改良肉的品质，


又可除去鬻性，便于飼養管理。

公兔去勢的方法如下：使公兔仰臥固定在手術臺上，剪去陰囊部份的毛，塗布七十%的酒精或碘酒消毒，用手緊壓下腹部，使陰囊緊張，然後用手押陰囊下部，防止睪丸逃入腹腔，用消毒過的銳刀，縱切陰囊皮約一公分，再切開陰囊內的總莖膜，睪丸就露出于陰囊外。用鉗子鉗住總莖膜與副睪丸尾部，用絲線結紮精絲後，切去睪丸。縫合切開部，再塗布碘酒。(完)



木瓜苗怎會種不活？

梅·哇·



蘇魯種木瓜生長快結果多，人人想種，可是，本社最近常常收到讀者來信，抱怨說，看了豐年廣告去買木瓜種苗，結果種不活。

本社對這件事情非常重視，經過幾次的調查，並和農業專家們研究的結果，得到了幾點結論，建議給各位準備種木瓜的農友們和木瓜苗商做參考。

(1) 為經濟打算，買苗木不如買種子，因為種子便於郵寄，郵費也低。同時種子不像種苗那樣容易受傷。凡是可靠的種苗商所發售的種子，包裝上都註明採種日期，當時發芽率等。

(2) 種苗木比用種子播種，當然長得快，收穫也早。但洽購苗木以前，必須先向苗商說明，苗木根部必須帶有一塊原土，寧可多付郵費。否則，如果你買到的一批絲毫不帶土的苗木，即使你有最好的管理，種下後十株中能一株都不活。

(3) 苗商應選擇粗壯苗出售，稚弱或徒長的種苗，無論如何小心地管理，仍是無法種活的。種苗商第一要講信用，假如信用不可靠，人們上當受騙也只是又一次。

(4) 郵送苗木時，應注意包裝妥善，不可使株桿受傷，根部原土鬆散，或頂部萎凋。

本刊七卷二十期五頁有一篇「塑膠布新用途」，我們建議木瓜種苗商，利用質輕而美觀的塑膠布來包裝苗木，包裹苗木的根部厚土。

(5) 本刊後列各期木瓜的文字，無論農友或種苗商，都應研究，如果你們還沒有完全看過，亟盼一讀，相信對於你們的木瓜栽培有利：

①「木瓜栽培法」四卷二期八頁；②「如何栽植木瓜」六卷十期十一頁；③「木瓜怎樣留種」六卷一期七頁；④「木瓜為什麼種不活」七卷十一期七頁。

附註：以上各期本社都有存書，如要補購，可函本社發行部洽購。