

適於水田裏作的 美濃早生蘿蔔

陳培昌

四、其他管理事項三點

由黃條金花蟲、菜螟蛾幼蟲食害腐敗，菌侵入發生軟腐病、黑腐病。應常常驅除防治。



第一期 卷八 第一

美

濃

早

生

蘿

蔔

(2) 消毒 種子可用福爾馬林(ホルマリン)

二百倍液，或水銀製劑八百倍液各浸漬二十分鐘消毒。菜園或十字花科蔬菜連作地，施用氯氫化鈣兼行消毒土壤，減少病蟲害。

(3) 播種 用鋤頭掘播溝，每處播六、七粒種子，覆土四至五臺分後輕壓。密植菜容易交叉徒長，減低根部生長，株間以八臺寸最理想。

(4) 間拔 葉子葉展開後，選正心臟型株及第一二葉除生長過強過弱，胚軸表皮消失等株。至第五、六葉始留一株。

二、施肥不妥易起分根

做畦後，全面撒布草木灰，混入土中。在播種一星期前，施過磷酸石灰，經充分混合後，施水肥覆土播種。

播種後第二星期、第四星期各做第一、二次追肥。至第六星期除草中耕後施追肥，培土。化學肥料、有機質肥料不宜施於播種子位置下方，更需充分混入耕土，避免發生分根。

肥料名稱	全部用量	基肥	追肥
水	四百	二百	
草木灰	一	一	
過磷酸石灰	一	一	
天	一	一	
天	一	一	
一	一	一	
一	一	一	
一	一	一	



蘿蔔糠心會減少經濟價值，須在未糠心前採收。春季栽培蘿蔔，因氣溫升高，會早糠心，所以應切實注意收穫適期，以免過遲收穫。

美濃早生蘿蔔施肥例 (單位：十公噸、臺斤)

(6)

(1) 整地 整地耕耘，做一、七至一〇臺尺寬的畦。蘿蔔主根先端假如被蟲蝕害，或伸入堆肥、土塊、耕土間隙時，會發生分根。因此，整地時要注意土壤濕度，打碎土塊，尤其在粘質土，需特別注意，以免影響主根生長。

一、從整地至間拔

三、常見的病蟲害

萎縮病病株葉部發生黃色紋斑，逐漸萎縮，減退生長。病原體由蚜蟲傳染，因此，需要徹底驅除蚜蟲。