

栽培荔枝的實際問題

——張開一拔——

近數年來，臺灣種植荔枝的風氣很盛。荔枝銷路好，價格高，如能配合加工，爭取外銷，的確是很有前途的事業。

一、理想的空中壓條

荔枝現在通用的繁殖法，是空中壓條法。空中壓條法，操作簡單，容易成活，品種可以保純。

選擇適當時期環狀剝皮，經一、二個月，剝皮處生成癒合組織後，包發根用的土或蘚苔，就可提早生根。其他詳細方法，請參照本刊七卷七期第十頁。

一年中，不論何時都可環狀剝皮。三、四月開始至六、七月的雨季，可免灌水，而且四月是全年荔枝生長最快的時期，生長快，發根也快。為利用農閑，一般可分為開花前及採收後二大時期舉行。

如於環狀剝皮後，用根多旺（ルートン）一份加水一份混和，塗於枝上部剝皮處，發根情形會更加優良。臺北市漢口街一段二十三號大豐農藥公司（上期本刊第七頁介紹的大豐農藥行）有根多旺出售，每瓶十公分，價錢十五元。

先環狀剝皮，等到一月或二個月後包土壓條，不但可減少生根時間（包土後），而且如果有沒剝乾淨的形成層，也可以在此時間內枯乾，不致於在包土後重生癒合連接，並且時間縮短，風害也可減少。

二、怎樣種植才易成活？

荔枝在一年之內，只要有苗不論何時均可種植，如不經假植，需即種植，在二、三月間最為合宜。

自壓條開始，至可剪取所需的時間，視壓條的方法與管理而不同。如在三、四月開始，用玻璃布包，管理又週到，很容易生根。如在前先剝皮，四月間已生癒合組織時包，生根更快，大約二個月根羣已佈滿，在這短期內就可剪下。但是如果用舊法以竹筒盛土包，又在九月以後壓條，且不注意灌水，這樣雖經過四、五個月，根羣還是無法密佈。

空中壓條繁殖的荔枝苗根羣原來就很纖細而且不多，因此在運搬途中，苗木要特別小心。從樹上直接剪取，不經過假植的，要連同竹筒或包棕或玻璃布帶土輸送，較為安全。運到目的地，用棕片包的可以連同棕片一起植入土中，用玻璃布或竹筒包的，需要解去竹筒，而後定植。為安全起見，苗木最好先假植於花盆中，經三、五個月，這時新葉發生不少，新根也很多，定植時，傾出花盆中的荔枝苗（傾前不可灌水，土乾才好傾出）而後種植；這樣種後生育可望較快，而不致枯死。如果苗木是自樹上直接剪來，種植時要細心覆土，慢慢加入細土，植後千萬不可在土面用腳踩土踏實，因為那纖弱細小的鬚根，一踩就折斷，苗木就不得成。

團仔冤家是常事


火皇文
壬酉圖



①阿明阿華兄弟，忽然珠彈過去，（他）才故意。



②二人相好變冤家，（打）批伊共殺木明（架打）家冤變好相人二（打）柳頭（得打）甲（破）皮，（頭低）犁頭頭錯知明。



③阿華返（回）去，（哭）聲大去（回）返華阿（淚流）流目見看（親母）母因（家的他）冤厝因明阿來走，較計厝厝因到來。

活。種植前要剪一部份枝條，以減少水分蒸發。定植前，植穴要加入堆肥一、二擔與土混合。植後要經常灌水。土壤不肥沃，又不施堆肥，雖然水份充足且已發生新葉，苗木仍有枯死的危險，這是因為營養份不繼所致，所以在植後二、三個月內，已有新葉發生，就須施稀薄的水肥（人糞尿），促進發育。

颱風來臨時，荔枝樹易被吹折，為害不淺。烏葉品種枝條比較脆弱，不耐風患，如在種植時樹旁栽種三、四株赤葉品種，然後靠接於分枝處，使成為四、五枝的主幹，內部交叉的枝，也相互牽連靠接，互相牽制扶持，可以減少颱風為害，又可增進生育。

三、合理的施肥

荔枝樹所用的肥料，通常以人糞尿或豬屎尿較多，每株施用一、二擔（十年生左右），再配合少量花生餅及加里與磷酸，或用過磷酸鈣二十%，食鹽二十%，大豆餅四十%，石灰二

十%等的混合肥料，在樹冠周下面，掘深三十公分的溝，每株十年生樹施用十公斤左右，然後覆土；每年於花開前（一、二月）施用一次，採果後（六、七月）又施用一次。五年生的樹照上述混合比例，分為二次施用。如單用氮肥，或氮肥用量過多，會刺激荔枝枝生育，減少開花或不開花。樹齡漸大，結實數量較多，需要增加肥料用量。假如不增用肥料，結果數量就難望增多。

四、缺水易落果

荔枝果實發育期間，剛好是旱季，平地可以灌溉的，需要每半個月或一個月灌溉一次。本省中部及北部雨水較多，旱害不如南部的嚴重，南部如在此時期不降雨，落果相當利害。山地不得灌水的，可用陶缸（木桶易被白蟻損害），底部留一孔，埋入樹下，然後盛滿水，水份就可源源流入土中，雖然花費勞力不少，但也是合算的。

種菜豆獲利多

嘉義縣新港鄉 陳糖

菜豆（豇豆）真容易栽培，產量多，價格好，下面是我去年栽培菜豆的經驗。

(1) 好的菜園 種菜豆的地點要高溫，排水好。

(2) 選擇白菜豆 菜豆最好選擇白菜豆（白裙帶），白菜豆長約二臺尺多，產量多，價格好，比較黑菜豆可增產三成（百分之三十）以上，請諸位農友要種一定要選白菜豆。


(3) 不可提早下種 菜豆在立春後十餘天下種，算是最早，請農友們不要提早下種，提早下種是非常不利的，因為農曆十二月正月常有寒流侵襲，菜豆幼苗生育緩慢，易遭寒冷而死。

(4) 施肥與灌水 種植後一個半月，每分地施用水肥二十擔，然後再施鉀肥和硫酸銨（分量各半），每分地不超過二十臺斤。假使沒有施鉀肥，葉多又大，花蒂被葉蓋下，結果不好。

在三月至四月，往往發生亢旱，每星期要灌水一次。



友農糖陳



⑥ 父母愛子，為人子者，當知父母之愛，不可不體。父受氣，母受氣，為人子者，當知父母之氣，不可不順。



⑥ 二人拍戲，熱鬧得很。拍戲的人，要拍得好，要看戲的人，也要看得好。拍戲的人，要拍得好，要看戲的人，也要看得好。



④ 二人拍戲，熱鬧得很。拍戲的人，要拍得好，要看戲的人，也要看得好。拍戲的人，要拍得好，要看戲的人，也要看得好。