

# 農業信箱

## 有毒農藥真危險

### 不可兒戲害生命

問：爲預防「巴拉松」中毒，可以服用少量「硫酸阿脫品」片或「拜脫品」片，如果用這兩種藥擦在皮膚或是放在口單裡，是不是也可以預防中毒？假如在使用「蜜粒多」，「PM」，或「巴拉松」前，用樟腦油或薄荷油擦在皮膚或放在口單裡，能不能預防中毒。（臺南市李明）

答：預防「巴拉松」中毒，可以服用少量「硫酸阿脫品」片或「拜脫品」片，但必須經醫生指示。

「硫酸阿脫品」和「拜脫品」都是口服藥劑，擦在皮膚或放在口單內不會有效。

用樟腦或薄荷油擦在皮膚上或放在口單裡，都不能預防有機磷劑的中毒。（王鼎定）

### 桐實粕可做肥料嗎？

問：油桐粕做肥料效果如何？比較花生粕如何，適合什麼農作物和土質？（南投蘇再臨）

答：桐實粕（油桐粕）做肥料，效果比較花生粕或大豆粕差。一般農作物都可用油粕作基肥，但必須在土壤中分解後，始能被作物吸收。高溫地區分解較速，寒冷地區分解較慢，各種土質都可應用桐實粕。（梁鉅英）

### 黃麻浸漬水

#### 對水稻有害

問：我的水稻田旁邊有一深溝，溝內浸黃麻，因此溝水全部變黑，而且很臭，一遇

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地址，以便本社迅速處理。

大兩時，水稻連稻葉全部淹沒水中四、五天，這樣有對水稻嗎？（嘉義縣布袋鎮張萬福）

答：水稻浸水四、五天，當然有害。尤其黃麻浸漬水，更有毒害。等水退後，請即時洗滌。（余慶東）

### 怎樣防治牛蟲？

問：東部農家所飼養的水牛，大部份都生蟲（シラミ），請問有甚麼藥可以驅除。大部份的農家都用DDT或花生油塗於其等治療，但是都沒有效果。（花蓮縣玉里鎮葉勝棋）

答：牛蟲用煙葉煎水驅除是有效的，也許使用不得法才無效。下面介紹幾種有效的防治法：①煙葉三十至五十公分，加水約一公升煎煮，然後用煎汁擦牛身，但不可全身都塗，因爲內有「尼可丁」（ニコチン），必須分數次每天輪流塗抹。②每日用木梳將毛多處的蟲及卵梳去，必要時剪毛，然後塗油（花生油也可），使蟲卵不能孵化。③塗擦DDT粉或BHC粉。④假如天氣不冷，水牛可多洗澡。⑤牛舍的草草，全部取出焚燒，燻蒸淋開水，使蟲卵破壞。（黃立羣）

### 牛乳房下垂後

#### 約一星期即生產

問：牛的乳房下垂後，再多久就可生產？（臺中縣清水鎮蔡伯源）

答：牛的乳房膨脹下垂後，約一星期左右，就會生產，此外應注意懷孕牛的腰角，如此處陷落，就表示牛隻在一、二日內即將分娩。（李登元）

### 水牛不吃草怎麼辦？

問：我家裏有隻水牛，年齡三歲，每天

放牧時，不高興吃草，請問如何治療？（花蓮縣壽豐鄉邱應輝）

答：水牛不喜歡吃草，要經過獸醫的詳細檢查才知道患的是什麼疾病，不過我不清楚你的牛吃其他的飼料如米糠、甘藷等，是不是也不高興吃？如果仍是不愛吃，你可以到中藥店去買四勿龍膽草煮水內服，一天二次，連吃二、三天，胃口或許要好轉。（黃立羣）

### 鷄糞中有肉狀物

#### 是否爲球蟲病？

問：我養二十隻來航、蓬花及紐漢雞，從小就給蘇爾藥水，飲一瓶後停用，發現大便中有紅色的（似肉）便，是否球蟲，有什麼辦法治療？（新北投梁重意）

答：雞隻的糞便有淡紅色的肉塊狀物，是因爲腸中粘膿混在糞便中，這是不正常的。至於急性球蟲病的血便，甚至排出完全的鮮紅血，這是球蟲病的主要病徵。（李登元）

### 臺中一五〇

#### 號栽培要點

問：我過去栽培臺中一二二號水稻品種，第二期時常發生紋枯病，今年第二期作我想改種臺中一五〇號，請問是不是比臺中一二二號好？（彰化縣和美鎮葉明輝）

答：臺中一五〇號在第二期作栽培，比其他品種較好，但栽培法須注意：①秧田日數十八至二十天，不可延長。②須於七月五日至七月八日間播種，於七月廿四至二十八日間插秧，過早過晚都不好。③施肥量及方法，照臺中六五號即可。（余慶東）

### 蘇竹栽植過密


#### 發筍會減少

問：有人說栽種蘇竹每棵的距離不可太近，假如太接近，發筍較少，是否事實？又什麼時候栽種蘇竹較好？（嘉義縣番路鄉草山村翁新道）

答：蘇竹栽植過近，因陽光不足，根株接近，肥分缺乏等關係，發筍會較少。適當栽植距離，大約六、七公尺。在嘉義一帶的栽植適期，一般在發筍完了後的十一月間，但是也可在發筍前一、二個月的三、四月間栽植。（黃希周）

### 蘇魯木瓜種苗出售

農友們：春季正是種瓜時，發芽快，成活率高，利用荒地，空地，畑地間作種蘇魯木瓜保證發財，你曾爲木瓜種不活而苦惱嗎？本園瓜苗帶土裝寄，包你種活，及販售精選種子，請莫失良機。



①瓜苗：派人指導種植，每株一元六角，不活退錢，草約備案。②帶土裝寄，每株一元。③普通瓜苗，每株八角。④普通瓜苗，每株五角。⑤下加，每株五角。⑥上每株五角。⑦上每株五角。⑧上每株五角。⑨上每株五角。⑩上每株五角。

樹德苗圃敬啟