

苗床準備 播種前二星期，將腐熟堆肥鋤入土壤中，然後與土壤充分混合。播種前，撒佈草木灰，並捻細土粒，做成高床，耙平床面。栽植一分地所需種子量為二十至三十公分。苗床面積，連同假植育苗時，約須五至八坪。

播種方法 ①條播法：用竹片或厚約一公分的木板，在苗床面壓出深約〇.三至〇.五公分的播種淺溝，溝距為六至九公分。將種子均勻播在溝內，種子如有數粒結成塊的，應先揉開。播後，稍加鎮壓，用腐熟堆肥或細土均勻覆蓋，至與床面齊平。上面再覆蓋稻葉，再用細孔噴水壺充分澆水。以後每日早晨及傍晚澆水二次。經三至五日發芽。

②撒播法：在耙平的苗床面，均勻播種，覆土厚度不可超過一公分。

苗床管理 播種後三至五日，種子開始發芽。發現發芽一半以上當日傍晚，除去稻葉。以後不宜多澆水。密生處應逐漸間拔，本葉初展開時，留苗距二至三公分。

假植 二、三星期後，本葉展開二枚時假植。苗距應增至株行距各為十公分。至預定定植期前數日，噴佈「馬拉松」及「大生」，預防病蟲害發生。（下期刊載定植與管理）

※

※

※

茄子的整枝摘葉摘花

文郁

整枝

第一花房開花時，除保留花房下面生長最旺的一支側枝外，盡速摘除其餘的側芽。保留的側枝，與主幹分歧的二支兄弟幹，應任其生長結果，而不可再摘芽。但是這三支枝幹，最好互相以一百二十度左右的角度，分開成為三角形平均生長，才免使植株倒伏。（請看左圖）

茄子植株老衰後，也可剪除老幹，施肥澆水培養新芽枝，再生產優良的果實。

摘葉


摘除下面的老葉，可以提高果實品質，減少病蟲害。但是摘法失當時，反而會減低果實品質和產量。一般說來，枝葉橫長的品種要輕摘，直立性的品種應多摘。花房下面留新葉三片，老葉二片，而再下面的老葉，就在上面花房的開花期，用剪刀剪除（要留葉柄）。

摘花

茄子一花房的花數，約有三至六朵。但是除了房成性的品種以外，普通的品種，每花房只能結一果實。就是說除每花房的第一朵花能結果外，其餘的花朵，都沒有結果的能力。所以，沒有摘花的必要。




（側枝下面的側芽要趕快摘除）




（枝幹要分開生長）



⑥ 理明有了聽獅阿
除種將草播真認
錢好賣成二收加
譽名好過改此從



⑤ 利不貢稻對仔稗
奇希無產生響影
除無若草稗信嘸
米白的成二收減



④ 除着稗(他)伊勒牛阿
錢價好無賣仔稗
米做假仔稗(可豈)通那
• (好不聲名)譽名呆出查旦一