


鐸 振 吳——

夏茶及秋茶應等新芽生長至四、五葉才摘心。二、三年生的茶樹，每年摘心二、三次（請看左上圖）。

②淺剪枝後的成木茶園應早採嫩探：上年淺剪枝面上新芽生

長至第三葉開面時，立即以一心二葉爲標準，全面採摘。早採不但可以增加採摘次數及生葉收量，而且因早採芽質未軟，也能提高成茶的品質。（請看左中圖）

③深剪枝成本茶園不採春茶：去年深剪枝的成本茶園，不採春茶。夏茶也只能輕採。假如有徒長枝，應行二段



摘採的(下中)園茶木成與(上)園茶小幼

▲茶蠶與茶紅蜘蛛▼

茶蠶的防治：①幼蟲三齡以前

噴射三・五%魚藤精乳劑二百五十至五百倍水溶液（在採摘後新芽未展開前使用）。②冬茶（當年十一

次年二月)用二五%DDT乳
百至六百倍水溶液噴射。

茶紅蜘蛛的防治：①採摘後無

新嫩芽展開時噴射二五「克氯苯」乳劑一千倍水溶液，每公頃一千至一千二百公升。②儘量利用冬季（十月至十二月）及雨期未到前噴射。

③以噴射二次爲宜，第二次於第一次噴射後七至十五天舉行。

葡萄苗園

彰化縣埔心村黃厝巷三四號

園主 薛

用



現有苗木優美目下正當移植之期欲購從速勿失良時
園主 敬白

園主敬白

農友們！！種植荔枝是農村最好的副業。但是第一要選種。第二臺灣荔枝有十餘種類，若選錯品種種植者，就是一生的錯誤。第三、一來費精神，二來了本錢。三來領土地。各位農友們！！如希望種植荔枝、若無氣嫌者，即請踴躍來做閩粵觀指教、無任歡迎。

林永旭荔枝苗本園



對於顧客
優待辦法
請看豐年
第九卷一
、二、三
期敝園之
廣告

荔枝苗現有尺數

4 3 2
尺尺尺
上上上
、、、
下下下
7 6 5
尺尺尺
上上上
、、、
下下下
10 9 8
尺尺尺
以上上
上、、
下下下