

# 識知業農

## 香蕉花有三種

香蕉的花有三種。最早開花，子房佔全花三分之二的，稱為有效花。有效花可以結成果實，約六至十段。有效花開完了，就開少數中性花，子房佔全花二分之一，中性花只結成細短無用的果實。以後再開的是雄花，子房佔全花三分之一，雄花可以繼續開到果實採收，不會結果，應該於香蕉開花結果後約三個月，離結果果段三至四寸的地方，將雄花花苞剪掉，以免消耗養分。切口不必塗藥，但是假如將雄花花苞去得太早，同時太近果段，可能使果軸腐爛。(朱慶國)

## 柑桔施肥須知

柑桔樹每年施肥三次，在二月上旬(發芽前)，六月上旬及九月中旬各施一次。在開花的時候，不要施肥。假如在開花的時候施肥，因施肥而掘傷根部，常引起落花及落果。掘溝施肥時，應儘量避免掘斷大根，所以，施肥溝不要太接近樹幹，並且不可開溝太深。施有機肥料時，掘溝至多深一尺，溝的範圍在樹冠外方直下。與別的化學肥料不同，應先將鳥肥與潮濕土壤混合均勻，堆於屋角，十天後再連土施下。尿素的施用量，差不多是硫酸銨的一半，假如葉面噴施，濃度為三百公分尿素加水二十四公升，噴濕全部葉面，但是應注意，尿素中含含「二縮尿」的成分超過一%，噴在柑桔葉上，常引起葉尖變黃，葉片早落。(蔡致謨)



幹樹近靠太不溝肥施

### 大生七十八 (DITHANE Z-78) 可濕性粉劑可防

止大豆銹病用300—350倍水溶液，每公頃800—1,000公升，在播種後五十天左右本病開始發生時，行第一次噴射，以後每隔七天噴射一次，共四次。又大生七十八能與安特靈乳劑混合使用，如防病與防蟲時期相同，應於安特靈乳劑水溶液中加入大生七十八。兩種藥劑混合方法是：在一〇〇公升安特靈乳劑水溶液中加入大生七十八可濕性粉劑280—330公分。

大生七十八亦可防止小麥銹病，柑桔象皮病及黑星病，菸草白星病及赤星病，一般蔬菜炭疽病，露菌病，疫病，紫斑病及銹病。

### 大生二十二 (DITHANE M-22) 可濕性粉劑防止西瓜、胡

瓜、番茄及馬鈴薯病害。並能促進生長增加產量。對番茄可增加產量至六成半。亦能防治蛛蟎。

### 可利生 (KARATHANEWD) 可濕性粉劑不特可防止白粉病並

可治已發生的白粉病。亦能防治蛛蟎。

### 開路生 (KELTHANE W) 大生七十八可濕性

可濕性粉劑專治各種蛛蟎。粉劑三磅紙袋美國原裝



臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路1756號三樓 電話：27467

郵政劃儲臺灣第2156號

函索農藥說明書附郵票四角即寄



### 肺癆病良藥問世

## 療肺散

主治

肺癆、吐血、止咳嗽、痰黑清肺、化痰、補虛癆、肺的各種病症等。

內政部許可證臺衛成字第六七一號

香港脚專門治療藥出現


## 腳濕靈

主治

腳趾濕氣病

不計年久

擦用後即止



第四〇五九號  
(四八)北市衛四廣檢字



癢癢病為腳趾濕氣病、專門治療藥

內政部許可證臺衛成字第三七三號

各地藥房均售

各地郵購均可向郵局劃撥儲金二二一五號

說明書函索即寄

臺北市重慶北路三段二四二號

景新製藥所出品