


農友知識



制這種討厭的露螺。（參看本刊六卷三期二十頁）

臺灣省農業試驗所與中央研究院的動

物研究所合作，已經從夏威夷引進一批一

露螺（右），現在農試所應用動物系的養

蟲室中飼養，這批外國來的嬌客，在裝有

冷氣的養蟲室中，受到很周到的招待，除

了由昆蟲專家隨時注意它的生活狀況外，

還有兩位小姐專管侍候它們。

成熟的「玫瑰蝸牛」，比成熟的露螺要小，只有露螺的七八分之一，雖然它可以吃掉與它身體同等大小的露螺，但在那種情形下，吃起來是相當費力的，「玫瑰蝸牛」寧願吃比它本身較小的露螺。

本刊記者在養蟲室中參觀時，會看到有二角錢幣大小的「玫瑰蝸牛」，將它的口器伸進蠶豆粒大小的露螺體內，津津有味的吃着。

農試所養蟲室中必須繁殖大量的小露螺，才够供應它們的食料，因此，那兩位小姐也相當忙碌了。

臺灣糖公司的屏東蔗作改良場，從琉球引進的幾隻「玫瑰蝸牛」，已經繁殖到相當多的個體，本省南部的氣候，也許更適合它們的生長。

這種吃蝸牛的蝸牛，還在試養的階段，將來是否可以放在田野裏讓它自行去尋找討厭的露螺，這「露螺」，是以前日本人誤當做「食用螺牛」引進臺灣的，由於氣候適合它的生長，現在滿山遍野都是，成為雜食多種農作物的大害蟲。（參看本刊六卷七期十頁）

注意防範・減少損失

美國加州大學生物防治系的一位教授，曾發表一項飼養「吃蝸牛的蝸牛」計劃，想利用天敵來遏

夏光番茄・耐暑力強，唯一能在平地夏季

栽培成功之優良品種，去年鳳

山熱帶園藝試驗所試作各品種中以夏光收量

最多。

興農早生甘藍・結球成績極優移植後六

十天就可收穫，為現有早生藍中之最優系統，五月可開始播種。

鳳山極早生花椰菜・六月可開始栽培之極早生種，移植後四五天就能收穫。

潮洋白瓜・耐熱性強之節成種，一棵一斤以上。

新香瓜・由日本直接輸入之種子，圓型富餘之優良種。

觀音白菜・白葉扁甲，三十天左右就能收穫，耐熱性品種一棵達一臺斤。

赤福三號蕃茄・三十四月在員林菜市場人氣最高之優良種。

今年の夕木は

興農の種子に決めませう

四九年興農園藝新知識，鐵定五月末發行無償贈閱，請看興農園藝新知識採用興農之優良種子。

興農通信六月號免費贈送

興農種子行

本行：臺北縣三重鎮重新路一段四三號

電話：四五三三二號

郵政劃撥四〇二八號

員林分行為擴展業務自三月二日遷移左記地址

分行：員林鎮民生路二七四號